

А. Самарџиски

**ХОМОТЕИЈА, ИНВЕРЗИЈА
И
ЗАДАЧИТЕ НА АПОЛОНИЈ**

**Природно-математички факултет — Скопје
Скопје, 1988**

Издание на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот

„Кирил и Методиј“ – Скопје

Аполониј. Сите задачи се решени со линијар и шестар на неколку различни начини. Во првите две глави задачите се решени со методи, чии теоретски основи не излегуваат од рамките на програмите по математика за средното образование. Во третата, пак, глава се дадени теоретски основи за комплетно решавање на овие задачи. Имено, со помош на инверзијата задачите се решени многу кратко и јасно.

Книгата ги содржи формулатите на познатите задачи на образование, коишто се интересираат повеќе за математиката, за наставниците по математика во средното и основното образование, како и за студентите по математика. Веруваме дека читателите ќе најдат во оваа книшка многу интересна и корисна материја.

Изложениот материјал беше презентиран пред учениците на летната математичка школа што се одржа во Охрид во Јули 1988 година.

Авторот

Кирил Наков

Во финансирањето учествува Републичката
заедница за научни дејности на СРМ

В о в е д

З А Д А Ч И Т Е
Н А
А П О Л О Н И Ј


Аполониј Пергски (околу 265-170 г.п.н.е.), еден од големите грчки математичари, живеел по смртта на Александар Македонски. Учел и творел во Александрија и Пергам при учениците на Евклид. Тој ја напишал работата „За допирањата“ за која се знае само од записите на Пап. Некои автори тврдат дека Аполониј за прв пат бара геометриските конструкции да се изведуваат само со линијар и шестар. Во работата „За допирањата“ тој ја поставил и решил следнава задача:

А. Да се конструира кружница, којашто допира три дадени кружници,

но не е познат методот со кој тој ја решил задачата.

Како специјални случаи од оваа задача може да се формулираат и други задачи. Но, претходно да видиме зошто секоја права и секоја точка може да се разгледуваат како кружници.

Нека е дадена права P , точка M на неа и полуправа h со почеток во M и нормална на P (прт. 1). Да конструираме кружница k со центар O на h , којашто ја допира правата P во M .



Нека точката се двжи по полуправата h и последователно ги зазема положбите $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$, како на прт. 1; соодветните кружници да ги означиме со $k_1, k_2, \dots, k_n, \dots$. Тогаш, може да се каже, дека секоја наредна кружница се повеќе се исправа, зашто секоја наредна кружница има помала кривина. При тоа, под кривина се подразбира вредноста на изразот $\frac{1}{r}$, каде што r е радиусот на кружницата. Ова дава за право секоја права да ја разгледуваме како кружница, имено како „кружница со бесконечно голем радиус“.

Исто така, и секоја точка може да се разгледува како кружница и тоа како „кружница со радиус нула“ коешто следува директно од дефиницијата на кружница.

Според овој договор, како гранични случаи од задачата на Аполониј (понатаму задачата A) се следниве задачи:

\checkmark 1. Да се конструира кружница, којашто минува низ три дадени точки.

\checkmark 2. Да се конструира кружница, којашто допира три дадени прави.

\checkmark 3. Да се конструира кружница, којашто минува низ две дадени точки и допира дадена права. $\text{ст. } 19, 40, 49, 71$

\checkmark 4. Да се конструира кружница, којашто минува низ две дадени точки и допира дадена кружница. $\text{ст. } 19, 53, 72$

\checkmark 5. Да се конструира кружница, којашто минува низ дадена точка и допира две дадени прави. $\text{ст. } 19$

\checkmark 6. Да се конструира кружница, којашто минува низ дадена точка и допира дадена права и дадена кружница. $\text{ст. } 20, 33$

\checkmark 7. Да се конструира кружница, којашто минува низ дадена точка и допира две дадени кружници. $\text{ст. } 21, 33, 23$

\checkmark 8. Да се конструира кружница, којашто допира две дадени прави и дадена кружница. $\text{ст. } 22, 25$

\checkmark 9. Да се конструира кружница, којашто допира дадена права и две дадени кружници. $\text{ст. } 23, 25$

Ако во задачите A и 1-9 се разгледуваат сите можни заемни положби на дадените елементи, се добиваат многу повеќе задачи.

Во елементарната геометрија задачите A и 1-9 се познати како задачи на Аполониј. Понатаму, за пократко, овие задачи ќе ги означуваме на следниов начин: A. $k_1, k_2, k_3; L. A, B, C;$

2. $a, b, c; \underline{3.} A, B, C; \underline{4.} A, B, k_1; \underline{5.} A, b, c; \underline{6.} A, b, k_1; \underline{7.} A, k_1, k_2;$

8. $a, b, k_1; \underline{9.} a, k_1, k_2.$ Бараната, пак, кружница секогаш ќе ја означуваме со k или $k^1, i=1, 2, \dots$, во случај кога задачата има повеќе од едно решение.

Оваа книшка е посветена на овие задачи и, ќе се трудиме, да укажеме на методите со кои тие може да се решат, да ги решиме, разгледувајќи ги сите можни случаи на заемна положба на елементите. Ќе ги користиме следниве методи: Геометриски метод на точки, хомотетија, степен на точка во однос на кружница и инверзија.

Задачите 1 и 2 се посветени уште од основното училиште.


Имено, познат е начинот на решавање на задачата 1, т.е. конструкција на кружница што минува низ три дадени точки A, B и C не се колinearни, тогаш бараната кружница k е кружницата описана околу триаголникот ABC . Ако, пак, точките A, B и C се колinearни, тогаш, според направениот договор,

бараната кружница е правата на која лежат тие точки. Исто така, познат е начинот на решавање на задачата 2, т.е. конструкција на кружница којашто допира три дадени прави a, b и c . Ако кои било две од правите a, b и c се сечат и сите три не минуваат низ иста точка, тогаш задачата има четири решенија; една од кружниците е кружницата вписана во триаголникот чии страни лежат на дадените прави, а другите три се однадвор вписаните кружници на тој триаголник (прг. 2). Ако две од правите a, b, c се меѓусебно паралелни, а третата ги сече, тогаш задачата има две решенија (прг. 3). Ако правите a, b, c минуваат низ една иста точка M , тогаш, според направениот договор, решение на задачата е точката M . На крајот, ако правите a, b, c се меѓусебно паралелни, тогаш задачата има бесконечно многу решенија, зашто секоја права x , паралелна со a, b и c , е решение на задачата.

Т л а в а I

Г Е О М Е Т Р И С КИ К О Н С Т Р У К Ц И И


1. Што е тоа „конструктивна задача“?



Црт. 2

Следните разгледувања имаат за цел да создадат теориска основа за решавање на задачата Д во ошт случај, а и да се дадат различни начини за решавање на некои од останатите задачи на Аполониј.

Црт. 3



2. Како се решава една конструктивна задача

Посебно важен момент во теоријата на геометриските конструкции се можностите на инструментите со кои тие се изведуваат.

Обично, за линијарот и шестарот, следниве конструкции се земаат како основни и тие ни укажуваат на можностите на овие инструменти:


- 1° конструкција на отсека ако се зададени нејзините крајни точки,
- 2° конструкција на права што минува низ две зададени точки,

$\checkmark 3^{\circ}$ конструција на кружница, ако се зададени центарот и радиусот,


$\checkmark 4^{\circ}$ конструкција на пресечна точка: на две прави, на права и кружница, на две кружници (ако таква точка постои).

Сега можеме да сметаме дека бараната фигура е конструирана на една конечна низа основни конструкцији, по чие извршување можеме да сметаме дека бараната фигура е конструирана.

Следнава задача ќе ја решиме на четири различни начини во зависност од инструментите со кои се изведува конструкцијата.



Прт. 1



Прт. 2

\checkmark Пример 1. Да се конструира средината на отсеката што е зададена со своите крајни точки А и В.

Решение. С о л и н и ј а р и ш е с т а р. Бараната точка ќе ја добиеме по овие основни конструкцији (прт. 1):

- претаме права низ точките А и В;
- претаме кружница $k_1(A, \overline{AB})$;
- претаме кружница $k_2(B, \overline{AB})$;
- пресечните точки М и Н пресечните точки на кружниците k_1 и k_2 ;
- претаме права низ точките М и Н.

Бараната точка е О = $AB \cap MN$.


С о д з о с т р а н л и н и ј а р (прт. 2). 1) $p=AB$;

2) прави q и r паралелни според на растојание h една од друга колку што е ширината на линијарот; 3) произволна точка М од r ;


4) $C=q \cap MB$, $D=q \cap MA$; 5) $N=AC \cap BD$; 6) бараната точка $O=p \cap MN$.

Навистина, АС и ВД се тежини линии во триаголникот АВМ, па Н е тежишето, од каде што следува дека MN е тежина линија, т.е. О е средина на отсеката АВ.

С о п р а в а г о л (прт. 3). Со прав агол го конструираме правоаголникот АМВN. Бидејќи дијагоналите во правоаголникот се преполовуваат, следува дека бараната точка е $O=MN \cap AB$.



Прт. 3



Прт. 4

- С а м о с о ш е с т а р (прт. 4). 1) $k_1(A, \overline{AB})$;
- 2) $k_2(B, \overline{AB})$; 3) $A_1 \in k_1 \cap k_2$; 4) $k_3(A_1, \overline{AB})$; 5) $A_2 \in k_2 \cap k_3$, $A_2 \neq B$;
- 6) $k_4(A_2, \overline{AB})$; 7) $C \in k_2 \cap k_4$, $C \neq B$; 8) $k_5(C, \overline{AC})$; 9) $k_1 \cap k_5 = \{M, N\}$;
- 10) $k_6(M, \overline{MA})$; 11) $k_7(N, \overline{NA})$; 12) $O \in k_5 \cap k_6$, $O \neq A$.

Точката О е средина на отсеката АВ. Навистина, според конструкцијата, точките А, В и С се колinearни и $\overline{AC} = 2\overline{AB}$. Триаголниците АОМ и АМС се рамнокраки со заеднички агол кај темето А, што значи дека тие се слични, од каде што следува дека:

$$\overline{AO} : \overline{AM} = \overline{AM} : \overline{AC},$$


$$\overline{AO} : \overline{AB} = \overline{AB} : 2\overline{AB},$$

$$\overline{AO} = \frac{1}{2}\overline{AB}.$$

3. Колку решенија има една конструктивна задача

Обично, во конструктивните задачи се бара конструкција на:

- точка; на пример, конструкција на точка што е еднакво оддалечена од три зададени точки (едно решение),
- права или кружница; на пример, конструкција тангенти на дадена кружница, паралелни со дадена права (2 решенија), конструција на кружница што минува низ зададена точка и ги допира краите на зададен агол (прг. 5, две решенија).



Прг. 5

Прг. 6

Но, може да се бара да се најдат различни положби на не-која фигура; така, на пример, ако треба да се најтра кружница со зададен радиус r што допира дадена кружница со радиус $R=2r$ и што допира дадена права а што минува низ нејзиниот центар (прг. 6, шест решенија).

Една конструктивна задача, во некои случаи, може и да нема решенија. На пример, не постои кружница што ги допира сите страни на правоаголникот, ако тој не е квадрат.

4. Елементарни конструктивни задачи

Тука ќе дадеме еден список од попрости конструкции кои се среќаваат и се користат во решавањето на повеќе конструктивни задачи. Некои од нив само ќе ги спомнеме, за некои ќе дадеме само скица, а некои ќе ги изведеме целосно.


- ✓ 1° Преполовување на зададена отсечка, т.е. конструкција на средна точка (пример 1 од §2).
- ✓ 2° Преполовување на зададен агол, т.е. конструкција на симетралата на тој агол.
- ✓ 3° Нанесување дадена отсечка на полуправа.
- ✓ 4° Конструкција на агол еднаков со зададен агол, т.е. нанесување агол од дадена полуправа.
- ✓ 5° Конструкција на права низ дадена точка P што е паралелна со зададена права p (прг. 7). Пртаме, по ред: 1) $\kappa(P, r)$, г погодно избран; 2) $A = \kappa \cap p$, $B = \kappa \cap p$; 3) $\kappa_1(B, \overline{BP})$, $\kappa_2(P, \overline{AB})$;
- 4) $Q = \kappa_1 \cap \kappa_2$; тогаш $PQ \parallel p$.



Прг. 7

✓ 6° Конструкција на права низ зададена точка P што е нормална на зададена права (прг. 8 и 9). Пртаме, по ред:


- a) $\kappa_1(P, r)$, $\kappa_1 \cap p = A$, $\kappa_2(A, r)$, $\kappa_2 \cap \kappa_1 = B$, $\kappa_3(B, r)$, $\kappa_3 \cap \kappa_1 = C$, $\kappa_4(C, r)$, $\kappa_4 \cap \kappa_3 = Q$; $PQ \perp p$.
- b) $\kappa(P, r)$, $\kappa \cap p = \{A, B\}$, $\kappa_1(A, r)$, $\kappa_2(B, r)$, $\kappa_1 \cap \kappa_2 = Q$; $PQ \perp p$.
- ✓ 7° Конструкција на збирот и разликата на две отсечки.
- ✓ 8° Деление на отсечка во даден однос.
- ✓ 9° Конструкција на триаголник ако се зададени a) три страни, б) страна и два агла, в) две страни и зафатен агол.



Прт. 8

Прт. 9

✓ 10° Конструкција на тангента на зададена кружница к што минува низ зададена точка Т (прт. 10 и 11):



Прт. 10

Прт. 11

а) Ако Т е точка од кружницата, тогаш се конструира нормала во Т на правата ОТ (види 6°);

б) Ако Т е надворешна точка за кружницата К, тогаш на

кружницата К треба да се определи таква точка Т₁, што $\angle OT_1O$ е прав агол; според Талесовата теорема, точката Т₁ ќе лежи и на кружницата К, за која отсечката ОТ е дијаметар. Сега, конструкцијата ќе биде оди по овој редослед: се конструира средината М на отсечката ОТ; кружницата К₁ (M, \overline{OM}); пресечните точки Т₁ и Т₂ на К₁ и К; правите ТТ₁ и ТТ₂ се бараните тангенти.

✓ 11° Конструкција на правоаголен триаголник ако се зададени хипотенузата и едната катета.

12° Конструкција на тангента на зададена кружница што е паралела со зададена права.

✓ 13° Конструкција на четврта геометричка пропорционала ($x = \frac{ab}{c}$).

✓ 14° Конструкција на средна геометричка пропорционала ($x = \sqrt{ab}$).

✓ 15° Конструкција на отсеката $x = \sqrt{a^2+b^2}$.

5. Решавање на конструктивна задача

При решавањето на една конструктивна задача најпрво треба да се согледаат случаите со кои се испршуваат сите можни избори на зададените елементи од задачата, т.е. да се согледаат сите можни фигури (ситуации) што ги овозможуваат тие елементи. Потоа, за секој од овие случаи, по можност, да се согледа дали задачата има решение.

На пример, елементите на задачата: „да се конструира тангента на зададена кружница што минува низ зададена точка“, дозволуваат три случаи (ситуации):

-точката лежи на кружницата; задачата има едно решение;
-точката е надворешна за кружницата; задачата има две решенија; и
-точката е внатрешна за кружницата; задачата нема решение.

Инаку, се препорачува процесот на решавањето на една конструктивна задача да ги има овие етапи: анализа, конструкција, доказ и дискусија.

Анализата. Анализата на задачата е подготвителна етапа, но, исто така, и најважна, бидејќи ја подготвува конструкцијата, односно, го дава клучот на решението.


Анализата има за цел да се согледаат можните зависности (врски) меѓу бараната фигура и дадените елементи. Тоа се постигнува со помош на скициран цртеж (со слободна рака), на кој се претставени зададената фигура и бараната фигура во таква положба, како што ја дозволуваат условите на задачата.

Обично, анализата почнува со правење на пртежот и тоа, речиси секогаш, со зборовите: „Да претпоставиме дека задачата е решена“. Потоа, внимателно го посматраме цртежот на бараната фигура, стремејќи се да ги изнајдеме зависностите меѓу дадените

елементи и фигурата што би овозможила задачата да се сведе на попроста, веќе позната задача.

Пример 2. Да се конструира триаголник со зададени a, t_a, h_a .

Нека задачата е решена и нека $\triangle ABC$ (прт. 12) е бараниот триаголник. Да го разгледаме првокот, на кој се нацртани t_a и h_a . Лесно се уочува дека правоаголниот триаголник AED може да



Прт. 12

се конструира, зашто се познати хипотенузата t_a и катетата h_a .

Значи, од зададените t_a и h_a може да се конструира помошна слика, т.е. $\triangle AED$, а потоа и триаголникот ABC (треба само направата ED , од точката D , да се нанесе во двете насоки растојанието $\frac{a}{2}$ и ќе се добијат темиња B и C).

Конструкција. По извршената анализа се соглавуваат кои основни конструкции (или некои веќе познати) треба да се направат и се пристапува кон нивото реализације.

Доказ. Со доказот сакаме да потврдиме дека конструкците

раната фигура навистина ги задоволува сите услови на задачата.

Дискусија. Обично, уште во анализата се определуваме кој метод ќе го употребиме при конструкцијата на бараната фигура. При таа конструкција најчесто се ограничуваме да бара-ме едно решение. За потполно решавање на задачата секогаш треба да се продискутираат следниве прашања:

- дали при различен избор на дадените елементи, т.е. дали секогаш, може да се изведе конструкцијата,
- колку решенија има задачата при секој можен избор на зададените елементи.

Дискусијата има за цел да ги изнајде условите при кои задачата е решлива, како и да го определи бројот на решенијата.


Обично, дискусијата се спроведува така, што конструкцијата се проследува чекор по чекор и секој чекор посебно се разгледува: дали е можно, на колку начини може да се изведе, итн.

Со наредниот пример ќе ги илустрираме спомнатите етапи на решавање на конструктивна задача. Притоа ќе ги наведеме сите нужни подности на процесот на решавањето.

Пример 3. Да се конструира триаголник од зададените елементи: една страна и тежишните линии на другите две страни, т.е. c, t_a, t_b .

Решение. Анализа. Нека задачата е решена (прт. 13) и притоа $\overline{AB}=c$, $\overline{AA}_1=t_a$, $\overline{BB}_1=t_b$, т.е. A_1 и B_1 се средини на страните BC и AC , соодветно. Тежишните линии AA_1 и BB_1 се сечат во тешиштето T , и притоа $\overline{AT}=\frac{2}{3}\overline{AA}_1$, $\overline{BT}=\frac{2}{3}\overline{BB}_1$,

триаголникот ABC ќе биде конструиран ако се определат неговите темиња. Бидејќи е зададена страната c , лесно може да се конструираат двете темиња A и B (ако се конструира отсечката $c=\overline{AB}$). Останува уште темето C .



Прт. 13

Прт. 14

Разгледувајќи го прт. 13, можеме да согледаме дека:

- C е пресек на полуправите AB_1 и BA_1 ;

- A_1 и B_1 лежат на полуправите AT и BT и притоа $\overline{AA}_1=t_a$, $\overline{BB}_1=t_b$.

Значи, треба да се конструира точката T ;

-точката T може да се определи како теме на триаголникот ABT со страни $\overline{AB}=c$, $\overline{AT}=\frac{2}{3}t_a$, $\overline{BT}=\frac{2}{3}t_b$.

Конструкција. Значи,

-конструираме $\triangle ABT$ со страни $\overline{AB}=c$, $\overline{AT}=\frac{2}{3}t_a$, $\overline{BT}=\frac{2}{3}t_b$;

-ти пртгаме полуправите АТ и ВТ и ги определуваме точките A_1 и B_1 , со $\overline{AA}_1=t_a$, $\overline{BB}_1=t_b$,

-ти пртгаме полуправите AB_1 и VA_1 ,

-половините AB_1 и VA_1 се сечат во С и го определуваат третото теме на бараниот триаголник.

Доказ. Да го разгледаме прт. 14, каде што точките A_2 и B_2 се средини на АТ, односно на ВТ, т.е. $\overline{A_2T}=\frac{1}{3}t_a$, $\overline{B_2T}=\frac{1}{3}t_b$. Четириаголникот $A_1B_1A_2B_2$ е паралелограм, бидејќи неговите дијагонали се преполовуваат со пресечната точка Т. Од тоа следува

$$\overline{A_2B_2} = \overline{A_1B_1}, \quad \overline{A_2B_2} \parallel \overline{A_1B_1}. \quad (1)$$

Отсеката A_2B_2 ги поврзува средините на две страни на $\triangle A B T$, па, според тоа, имаме

$$\overline{A_2B_2} = \frac{1}{2} \overline{AB}, \quad A_2B_2 \parallel AB \quad (2)$$

Од (1) и (2) заклучуваме дека

$$\overline{A_1B_1} = \frac{1}{2} \overline{AB}, \quad A_1B_1 \parallel AB,$$

од каде што следува дека точките A_1 и B_1 се средини на страниите ВС и АС на $\triangle ABC$, односно дека отсеките $\overline{AA}_1=t_a$, $\overline{BB}_1=t_b$ се најстина зададените тежишни линии.


Дискусија. Триаголникот АВТ со страни c , $\frac{2}{3}t_a$, $\frac{2}{3}t_b$ може да се конструира ако и само ако $c < \frac{2}{3}(t_a + t_b)$ и $c > \frac{2}{3}|t_a - t_b|$, подека другите конструции секогаш се изведливи. Значи, задачата ќе има единствено решение, ако зададени-те отсечки c , t_a , t_b , го задоволуваат условот $\frac{2}{3}|t_a - t_b| < c < \frac{2}{3}(t_a + t_b)$.

6. Геометриско место на точки

Една геометриска фигура се дефинира како множество точки; секое множество точки можеме да го наречеме и геометриско место на точки. Значи, определување на едно геометриско место на точки (геометриска фигура) всуност, е една задача за образување на множество точки според некој признак.

✓ **Пример 4.** Да се најде геометриско место на точки од кои една зададена отсека "се гледа" под даден агол.

Решение. А и а ли з а. Нека зададената отсека АВ и аголот α се најдат така, што $\angle A M B = \alpha$ (прт. 15). Според теоремата за перифериските агли во кружницата, секоја точка, различна од А и од В, на лакот АВМ на кружницата што минува низ точките А, М и В, може да е теме на перифериски агол еднаков со α .



Прт. 15


Исто така, ако се конструира аголот α и во другата полутрамнина, определена со правата АВ, како на прт. 15, $\alpha = \angle ANB$, тогаш отсеката АВ ќе се гледа под агол α и од секоја точка, различна од А и В, на лакот АВ на кружницата што минува низ точките А, N, В.

Доказ. Од анализата се гледа дека секоја точка од ласите АМВ и АНВ (различна од А и В) припаѓа на бараното геометриско место. Ќе покажеме дека од секоја друга точка, отсеката АВ се гледа под агол различен од α . Нека Р е една внатрешна точка (прт. 15); да ја определиме точката Q како пресек на АР и лакот. Аголот АРВ е надворешен за $\triangle PQB$, па, според тоа, $\angle AQB > \angle AQB = \alpha$. На ист начин се покажува дека $\angle AQB < \alpha$ и во случајот кога Р е надворешна точка.

Значи, геометриското место на точки од кои зададената отсека АВ се гледа под даден агол α е фигурата образувана од два лака на кружниците што минуваат низ точките А и В и се симетрично расположени во двете полутрамнини, образувани од правата АВ; точките А и В не му припаѓаат на тоа геометриско место.

✓ Пример 5. Да се најде геометриското место на точки, за кои односот на разстојанијата до две дадени точки A и B е еднаков на даден број $\lambda > 0$, $\lambda \neq 1$.

Решение. Нека M и N се точки од правата AB , така што $\frac{AM}{BM} = \lambda$ и $\frac{AN}{BN} = \lambda$ (прт. 16) и нека P припаѓа на бараното геометриско место, т.е. $\frac{AP}{BP} = \lambda$.



ПРТ. 16

Од $\frac{AM}{BM} = \frac{AP}{BP}$ следува дека MP е симетрална на аголот APB , а од $\frac{AN}{BN} = \frac{AP}{BP}$ следува дека NP е симетрала на аголот KPB , т.е. $\angle KNP = 90^\circ$. Значи, бараното геометриско место на точки е кружница со дијаметар MN . Оваа кружница се вика Аполониева кружница за точките A и B .

7. Метод на геометрички места


Суштината на овој метод за решавање на конструктивни задачи е во следниво: ако бараното решение е точка и ако е подложено на два или повеќе услови, тогаш ги бараме геометриските места на точки за секој услов посебно. Бидејќи секое од геометриските места ќе бидат претставени со фигура, заедничките точки на овие фигури (ако постојат) ќе бидат решенија на задачата.

✓ Пример 6. Да се определат точките што се еднакво оддалечени од точките A и B и од кои отсеката AB се гледа под даден агол α .

Решение. Ќе формираме две геометрички места:

1° Точките што се еднакво оддалечени од A и B лежат на права што е нормална на правата AB и што минува низ средината на отсеката AB , т.е. лежат на симетралата на отсеката AB .

2° Точките од кои отсеката AB се гледа под агол α ; таа конструкција ја изведовме во претходниот раздел.



ПРТ. 17


На прт. 17 се напретани и двете геометрички места; решенијата на задачата се точките P и Q .

Сега ќе преминеме на решавање на задачите на Аполониј, т.е. на оние специјални случаи, коишто може да се решат со помош на методот на геометриски места.

✓ Задача 3 (A,B,C). Очигледно е дека ако точките A и B лежат во различни полумнини во однос на правата C или и двете лежат на правата C , тогаш задачата нема решение. Ако $A \in C$, а $B \notin C$, тогаш задачата има единствено решение. Центарот O на бараната кружница ќе лежи на симетралата S на отсеката AB и на правата P што минува низ A и е нормална на C .

Затоа, да претпоставиме дека $A, B \notin C$ и дека A, B лежат во иста полумнина во однос на правата C . Ако правата AB е паралелна со правата C , задачата има две решенија. Едното решение е кружницата описана околу триаголникот ABM , каде

што M е пресечната точка на симетралата s на отсечката AB со правата c , а другото решение е правата AB (прт. 18 а)). Останува да го разгледаме случајот кога правата AB не е паралелна со правата c .



Прт. 18 а)

Да претпоставиме дека задачата е решена и нека $k(O, r)$ е бараната кружница, којашто правата c ја допира во точката X (прт. 18 б)). Ако A' е симетричната точка на A во однос на правата c , тогаш:

$$\begin{aligned} \gamma_{A'XB} &= \gamma_{A'XN} + \gamma_{NXB} = \gamma_{AXN} + \gamma_{NXB} = \\ &= \gamma_{AXB} + \gamma_{NXB} = \gamma_{KNB}. \end{aligned}$$

Значи, точката X лежи на геометриското место на точки Γ од кои отсекката $A'B$ се гледа под агол $\alpha = \gamma_{KNB}$ и тоа на оној лак \bar{k} од Γ кој лежи во полуромнината во однос на правата $A'B$ која не ја содржи точката K . Следствено, $X \in \Gamma \cap c$.


Прт. 18 б)

Ако Y е пресечната точка на правата c со лакот кој лакот \bar{k} го дополнува до кружница (прт. 19), тогаш $\gamma_{A'YB} = 180^\circ - \gamma_{A'XB} = 180^\circ - \gamma_{KNB} = \gamma_{LNB}$, од каде што следува дека и кружницата што минуванија точките A, B и Y е исто така решение на задачата.

Задача 4 (A, B, k_1). Очигледно дека, ако една од точките е внатрешна, а другата надворешна за кружницата k_1 , или, пак, и двете лежат на k_1 , тогаш задачата нема решение.


Овде ќе го разгледаме специјалиниот случај кога $A \in k_1$, а $B \notin k_1$. Ако $k(O, r)$ е бараната кружница, тогаш O лежи на правата O_1A и на симетралата s на отсечката AB . Значи, ако s и O_1A не се меѓусебно паралелни, т.е. ако AB не е тангента на k_1 , тогаш задачата има единствено решение и $O = s \cap O_1A$; ако, пак, правата AB е тангента на k_1 , тогаш решението на задачата е правата AB .

Задача 5 (A, b, c). Да го разгледаме прво случајот кога правите b и c се меѓусебно паралелни и точката A лежи меѓу нив (прт. 20). Ако d е растојанието меѓу b и c , тогаш геометриското место Γ_1 на центрите на кружниците што ги допираат правите b и c е правата s паралелна со b и c и на растојание $\frac{d}{2}$ од нив; геометрско место, пак, место Γ_2 на центрите на кружниците со радиус $r = \frac{d}{2}$ и што минуваат низ точката A е кружницата $\bar{k}(A, r = \frac{d}{2})$. Значи, центарот O на бараната кружница припаѓа на $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Задачата има три решенија. Случајот кога A не лежи меѓу b и c разгледај го сам (задачата има единствено решение).



Прт. 19

Нека сега правите b и c се сечат. Ако $A=b \cap c$, тогам
решение е точката A . Ако $A \notin b, A \notin c$, тогам задачата има две ре-
шенија; центрите O^1 и O^2 на бараните кружници се пресечните
точки на нормалата r на b во A и симетралите s , и s_2 на аги-
те образувани со правите b и c . Затоа, да претпоставиме дека
 $A \notin b$ и $A \notin c$ (прт. 21). Ако $k(O, r)$ е бараната кружница, тогам



Прт. 21

нејзиниот центар O ќе лежи на симетралата s на аголот образу-
ван од b и c каде што лежи точката A , а ќе минува и низ точ-
ката A' симетрична на A во однос на s . Значи, во овој случај
задачата се сведува на задачата 3, конструција на кружница
што минува низ точките A, A' и ја допира правата b .

Задача 6 (A, b, k_1). Ќе разгледаме два специјални случаи.


Нека $A \in k_1$ и нека t е тангентата на k_1 во A ; задачата се
сведува на задача 5 (A, b, t). Ако правата b минува низ A и ја
сече кружницата k_1 , решение е точката A ; ако b и t се меѓу-
 себи паралелни и $b \neq t$, задачата има едно решение; ако $b = t$,
задачата има бесконечно многу решенија;

Ќе разгледаме два други специјални случаи.

Нека кружниците k_1 и k_2 се расположени произвилно и нека
 $A \in k_1, A \notin k_2$; ако t е тангентата на k_1 во A , тогам задачата се
сведува на задачата 6 (A, t, k_2).


Нека, сега, k_1 и k_2 се концентрични со центар во точката
 O_1 и нека $r_1 > r_2$. Геометриското место Γ_1 од центрите на
куружниците коишто ги допираат кружниците k_1 и k_2 се состои од
две кружници концентрични со дадените радиуси $r' = \frac{1}{2}(r_1 + r_2)$
односно $r'' = \frac{1}{2}(r_1 - r_2)$. Геометриското, так, место Γ_2 од центрите
на кружниците со даден радиус (r' или r'') и минуваат низ
точката A е кружница со центар A и радиус $r'(r'')$. Тогаш цента-
рот O на бараната кружница, ако таква постои, ќе припаѓа на
множеството $\Gamma_1 \cap \Gamma_2$.

Задачата може да има најмногу четири решенија. Ако $d = \overline{AO_1}$,
задачата 3 (O_1, A_1, b_1), а потоа лесно се конструира и бараната
куружница.



Прт. 22

Слично се решава и случајот кога $A \in k_2, A \notin k_1$, и бараната
куружница $k(O, r)$ ја допира кружницата k_1 однатре (прт. 23).




Прт. 23

или $d=r_2$ задачата има две решенија; при $r_2 < d < r_1$ задачата има четири решенија.

Задача 8 (a, b, k_1). Нека правите a и b се меѓусебно паралелни и нека d е нивното растојание. Геометриското место Γ_1 на центрите на кружниците коишто го допираат правите a и b е права s паралела со a и b и на растојание $\frac{d}{2}$ од a ; геометриското, пак, место Γ_2 на центрите на кружниците со даден радиус $\frac{d}{2}$ и кои ја допираат кружницата k_1 , се состои од две концентрични кружници (со центар O_1) и радиуси $r_1 + \frac{d}{2}$ односно $|r_1 - \frac{d}{2}|$. Центарот O на бараната кружница, ако таква постои, ќе припаѓа на множеството $\Gamma_1 \cap \Gamma_2$.


Задачата може да има најмногу четири решенија. Ако d_1 е растојанието од O_1 до правата s , тогаш: при $d_1 > r_1 + \frac{d}{2}$ задачата нема решение; при $d_1 = r_1 + \frac{d}{2}$ задачата има едно решение; при $r_1 - \frac{d}{2} < d_1 < r_1 + \frac{d}{2}$ задачата има две решенија; и $d_1 = r_1 - \frac{d}{2}$ задачата има три решенија; при $0 \leq d_1 < r_1 - \frac{d}{2}$ задачата има четири решенија.

Слично се разгледува случајот $r_1 < \frac{d}{2}$ (задача има најмногу четири решенија) и случајот $r_1 = \frac{d}{2}$ задачата има најмногу две решенија.



Прт. 24

Нека, сега, правите a и b се сечат во точката M и нека бараната кружница $k(O, r)$ ја допира кружницата $k_1(O_1, r_1)$ однадвор (прт. 24); тогаш кружницата $\bar{k}(O, r+r_1)$ ќе минува низ O_1 .



Прт. 25

Задачата може да има најмногу осум решенија.

Задача 9 (a, k_1, k_2). Ќе разгледаме два специјални случаи.


Задача 9 (a, k_1, k_2). Ќе разгледаме два специјални случаи. Нека кружниците k_1 и k_2 се концентрични со центар O_1 и радиуси r_1 и r_2 соодветно при што $r_1 > r_2$. Геометриското место Γ_1 на центрите на кружниците коишто ги допираат кружниците k_1 и k_2 се состои од две концентрични кружници со центар O_1 и радиуси $r' = \frac{1}{2}(r_1+r_2)$ и $r'' = \frac{1}{2}(r_1-r_2)$ соодветно. Геометриското, пак, место Γ_2 на центрите на кружниците со даден радиус (r' или r'') и кои ја допираат правата a се состои од две прави r и q паралелни со a и на растојание r' или r'' од неа. Тогаш центарот O на бараната кружница припаѓа на множеството $\Gamma_1 \cap \Gamma_2$.

Во овој случај задачата може да има четири, две или имено решеније.

Вториот специјален случај кога $r_1=r_2$ може да се сведе на задачата 3 и за решавање го оставаме на читателот.

Задача А (k_1, k_2, k_3). Ке разгледаме неколку специјални случаи. Јасно е лека, ако две од кружниците k_1, k_2, k_3 се соодветно внатрешна и надворешна за третата, тогаш задачата нема решение. Ако, пак, трите кружници минуваат низ иста точка и две по две се допираат во неа, тогаш задачата има бесконечно многу решенија.

Нека кружниците k_1, k_2, k_3 се со ист радиус r , и нека секоја од нив ги допира другите две (се разбира центрите да не им се колинеарни, прт. 26). Да претпоставиме лека сме конструирале



Прт. 26

кружница $k(O, r)$, којашто ги допира сите три (како на пртежот); тогаш кружницата $\bar{k}(O, R=r-r)$ ќе минува низ центрите O_1, O_2, O_3 . Кружницата \bar{k} е описаната кружница околу триаголникот $O_1O_2O_3$, којашто лесно се конструира, а потоа и бараната кружница $k(O, R+r)$. Решение на задачата е, исто така, и кружницата $k'(O, R-r)$.

Нека две од кружниците се допираат, а третата не минува низ допирната точка. На пример, нека k_1 и k_2 се допираат во точката M , а k_3 не минува низ M . Ако t е тангентата на k_1 и k_2 во M , тогаш задачата се сведува на задачата 6 (M, t, k_3). Пак, некоја кружница може да минува низ точката M , а тоа ќе има и друго решение, ако k_1 и k_2 се различни.

На крајот, да го разгледаме и случајот кога $k_1(O_1, r_1)$ и $k_2(O_2, r_2)$, $r_1 > r_2$, се концентрични, а k_3 е расположена произволно во однос на k_1 и k_2 . Геометриското место Γ_1 на центри-те на кружниците, коишто ги допираат кружниците k_1 и k_2 се состои од две концентрични кружници со центар во O_1 и радиуси $\frac{1}{2}(r_1+r_2)$ и $\frac{1}{2}(r_1-r_2)$ соодветно. Геометриското, пак, место Γ_2 од центрите на кружниците со даден радиус $\frac{1}{2}(r_1+r_2)$ односно $\frac{1}{2}(r_1-r_2)$ се состои од четири концентрични кружници со центар во точката O_3 и радиуси $r_3 + \frac{1}{2}(r_1+r_2)$, $r_3 - \frac{1}{2}(r_1+r_2)$, $r_3 + \frac{1}{2}(r_1-r_2)$ и $r_3 - \frac{1}{2}(r_1-r_2)$ соодветно. Центарот на бараната кружница ќе припаѓа на множеството $\Gamma_1 \cap \Gamma_2$. Задачата може да има најмногу осум решенија.

Х О М О Т Е Т И Ј А

Специјално, ако $k=-1$ и ако $\chi_{O,-1}(A)=A'$, тогаш имаме $\overset{\rightarrow}{OA}'=-\overset{\rightarrow}{OA}$, т.е. O е средина на отсечката AA' . Значи, ако σ_O е централна симетрија со центар во точката O , тогаш $\chi_{O,-1}=\sigma_O$, т.е. хомотетија со коефициент -1 е централна симетрија. Ако, пак, $k=1$, тогаш $\chi_{O,1}=e$ – идентичната трансформација.

1. Дефиниција и својства

Нека O е фиксирана точка во рамнината и $k \neq 0$ даден реален број. Ако A е произволна точка во рамнината, тогаш точката A' што го задоволува условот

$$\overset{\rightarrow}{OA}' = k \overset{\rightarrow}{OA} \quad (1)$$


е единствено определена. Со тоа добиваме една трансформација во рамнината, која се вика хомотетија со центар O и коефициент k : ќе ја означуваме со $\chi_{O,k}$ или, само, со χ (читај χ).

Значи,

$$\chi_{O,k}(A) = A' \iff \overset{\rightarrow}{OA}' = k \overset{\rightarrow}{OA}. \quad (2)$$

Нека $\chi_{O,k}(O)=O'$; тогаш имаме $\overset{\rightarrow}{OO}'=k \overset{\rightarrow}{OO}=k \vec{O}$, а тоа значи дека $O'=O$, т.е. центарот O е неподвижна точка за хомотетијата $\chi_{O,k}$.

Ако $k > 0$, тогаш $\overset{\rightarrow}{OA}'=k \overset{\rightarrow}{OA}$, ако $k < 0$, тогаш $\overset{\rightarrow}{OA}'=-k \overset{\rightarrow}{OA}$. Значи, A' лежи на полуправата OA . На пример, ако $k = \frac{2}{3}$, тогаш имаме $\overset{\rightarrow}{OA}'=\frac{2}{3}\overset{\rightarrow}{OA}$. Притоа, A' е онаа точка од отсечката OA , која ја дели во однос $2:1$ (прт. 1).




Прт. 1

Ако $k < 0$, тогаш векторите $\overset{\rightarrow}{OA}'$ и $\overset{\rightarrow}{OA}$ се спротивно насочени. Тоа значи дека точката O е меѓу точките A и A' . На прт. 2 се најдени точките $A' = \chi_{O,-1/2}(A)$ и $B' = \chi_{O,-1/2}(B)$ при дадени A и B .

Теорема 1. Секоја хомотетија $\chi_{O,k}$ е бијекција и притоа со доказот дека хомотетијата $\chi_{O,k}$ е инјекција, ја докажавме и следнива теорема:

Теорема 2. Ако $\chi_{O,k}(A)=A'$, $\chi_{O,k}(B)=B'$, тогаш $A'B'=kAB$, т.е. векторите $\overset{\rightarrow}{A'B'}$ и $\overset{\rightarrow}{AB}$ се колinearни и, притоа, ако $k > 0$ тогаш тие се исто насочени, а ако $k < 0$, тогаш тие се спротивно насочени.

Од оваа теорема следува дека секоја хомотетија е единствено определена со центарот и со еден пар точки, колinearни со него.




Прт. 2

Навистина, нека O, A и A' се три различни колinearни точки. Тогаш, векторите $\overset{\rightarrow}{OA}$ и $\overset{\rightarrow}{OA}'$ се колinearни, па постои реален број $k \neq 0$ таков што $\overset{\rightarrow}{OA}'=k \overset{\rightarrow}{OA}$. Тоа значи дека $\chi_{O,k}(A)=A'$.

Да видиме сега како ќе ја најдеме сликата на произволна точка B при $\chi_{O,k}$. Нека B е точка што не е колinearна со O и A (прт. 3). За да ја најдеме точката $B'=\chi_{O,k}(B)$, ја повлекуваме

правата OB , затоа B' е колинеарна со O и B . Векторите \vec{AB} и $\vec{A'B'}$ се колинеарни, па значи точката B' лежи и на правата a' $k \neq 1$, и, притоа,



Прт. 3

што минува низ A' и е паралелна со правата AB . Од тоа следува дека $B' = OB \cap a'$. Ако, пак, C е колинеарна со точките O и A , $k \neq 1$, така што важи (4); тогаш правите AA' и BB' се сечат, па наоѓаме $B' = \chi_{O,k}(B)$, а потоа, користејќи ја неа, ја наоѓаме и точката $C' = \chi_{O,k}(C)$, (прт. 3).

Задачи

\checkmark 1. Ако $k \neq 1$, тогаш точката O е единствена неподвижна точка за хомотетијата $\chi_{O,k}$.

Решение. Нека A е произволна точка за која $\chi_{O,k}(A) = A$; според дефиницијата на хомотетија, ќе имаме $\vec{OA} = k \vec{OA}$, т.е. $(k-1)\vec{OA} = \vec{0}$. Од $k \neq 1$ следува $\vec{OA} = \vec{0}$, т.е. $A = O$, што значи дека O е единствена неподвижна точка за хомотетијата $\chi_{O,k}$.

\checkmark 2. Нека A и A' се две различни точки. Дали постои хомотетија χ , така што $\chi(A) = A'$?

Решение. Да претпоставиме дека таква хомотетија постои; тогаш нејзиниот центар O е колинеарен со A и A' , а од $A \neq A'$ и од задачата 1, следува дека $O \neq A, A'$.

Обратно, нека O е произволна точка од правата AA' различна од A и A' и нека $k = \vec{OA} : \vec{OA}'$; тогаш имаме $\vec{OA}' = k \vec{OA}$, па ако χ е хомотетија со центар O и коефициент k ќе имаме $\chi(A) = A'$.

Следствено, секоја точка O од правата AA' , различна од A и A' е центар на една таква хомотетија.

\checkmark 3. Нека A, B, A', B' се четири различни точки. Дали постои хомотетија χ , така што $\chi(A) = A'$, $\chi(B) = B'$.

Решение. Да претпоставиме дека таква хомотетија χ постои. Ако O е центарот, а k коефициентот на χ , тогаш $O \neq A, B, A', B'$, $k \neq 1$, и, притоа,

$$\vec{A'B'} = k \vec{AB}. \quad (4)$$

Обратно, да претпоставиме дека постои реален број $k \neq 0$ и $k \neq 1$, така што важи (4); тогаш правите AA' и BB' се сечат, па нека $O = AA' \cap BB'$. Триаголниците OAB и $O'A'B'$ се слични, па следува дека

$$\vec{OA}' : \vec{OA} = \vec{OB}' : \vec{OB} = \vec{A'B'} : \vec{AB} = |k|.$$

Упате позаде, ќе важи и

$$\vec{OA}' : \vec{OA} = \vec{OB}' : \vec{OB} = \vec{A'B'} : \vec{AB} = k,$$

што значи дека ако χ е хомотетија со центар O и коефициент k , тогаш $\chi(A) = A'$, $\chi(B) = B'$.

Следствено, постои хомотетија χ , таква што $\chi(A) = A'$, $\chi(B) = B'$ ако и само ако постои реален број $k \neq 0$ и $k \neq 1$, така што важи (4), т.е. ако и само ако векторите \vec{AB} и $\vec{A'B'}$ се колинеарни но различни.

Да претпоставиме, сега, дека $A'B' = AB$; тогаш четириаголникот $A'B'BA$ е паралелограм, од каде што следува дека $\vec{AA'} = \vec{BB'}$. Ако $\vec{a} = \vec{AA'}$ и т.е. трансформација за вектор \vec{a} , тогаш $\tau(A) = A'$, $\tau(B) = B'$.

2. Слики на некои фигури при хомотетија

Во претходниот дел видовме дека, ако $\chi_{O,k}$ е дадена хомотетија, и ако $\chi_{O,k}(A) = A'$, $\chi_{O,k}(B) = B'$, тогаш $\vec{A'B'} = k \vec{AB}$ (теорема 2), т.е. векторите \vec{AB} и $\vec{A'B'}$ се колинеарни. Според тоа:

-колинеарни точки при хомотетија се пресликиваат во колинеарни точки,
-права при хомотетија се пресликува во права, паралелна со дадената.

Тоа значи, дека ако a е дадена права и $\chi_{O,k}(a) = a'$, тогаш правите a и a' се паралелни. Ако правата a минува низ центарот O на хомотетијата, тогаш, билејќи $\chi_{O,k}(O) = O$, правата a'

ке минува исто така, низ точката O , т.е. $a' = a$. Значи, секоја права што минува низ центарот O на хомотетијата $\chi_{O,k}$ се пресликува во себе, т.е.

$$\text{Од } a \Rightarrow \chi_{O,k}(a) = a.$$

За да ја најдеме правата $a' = \chi_{O,k}(a)$ доволно е да ја најдеме сликата A' на една точка A од a и потоа да ја конструираме правата што минува низ A' и е паралела со правата a (прт. 4).



Прт. 4

Прт. 5

Нека $k(S, r)$ е дадена кружница и $\chi_{O,k}$ дадена хомотетија. Ако M е произволна точка од кружницата $k(S, r)$ и $\chi_{O,k}(M)=M'$, $\chi_{O,k}(S)=S'$, тогам

$$\overline{S'M'} = |k| \overline{SM} = |k|r.$$

Од ова следува дека M' лежи на кружницата $(S', |k|r)$. Значи, сликата на кружницата $k(S, r)$ при хомотетијата $\chi_{O,k}$ е кружница со центар $S'=x_{O,k}(S)$ и радиус $|k|r$.

На прт. 5 е претставена сликата на кружницата $k(S, r)$ при хомотетијата $\chi_{O,3/2}$.

Нека сега е даден агол $\angle CAB$ и хомотетија $\chi_{O,k}$. Ако $x_{O,k}(A)=A'$, $x_{O,k}(B)=B'$, $x_{O,k}(C)=C'$ (прг. 6 и 7), тогаш имаме $B'A' \overset{\rightarrow}{=} kB\vec{A}$, $B'C' \overset{\rightarrow}{=} kB\vec{C}$, т.е. полуправите $B'A'$ и BA , односно $B'C'$ и BC се паралелни и притоа или се исто насочени (ако $k > 0$, како на прт. 6) или се спротивно насочени (ако $k < 0$, како на прт. 7). Значи, во секој случај $\angle A'B'C' = \angle ABC$, т.е. агол при хомотетија се пресликува во нему еднаков агол.


Од тоа, пак, следува:

-заемно нормални прави при хомотетија се пресликуваат во заемно нормални прави,

-секој триаголник при хомотетија се пресликува во нему сличен триаголник.



Прт. 6



Прт. 7

Задачи

1. Дали постојат кружници кои се неподвижни при хомотетијата $\chi_{O,k}$, $k \neq 1$?

Решение. Ако кружницата (S, r) е неподвижна при хомотетијата $\chi_{O,k}$, $k \neq 1$, тогаш мора да биде $\chi(S)=S$ и $r'=|k|r=r$, што значи дека $S=0$ и $k=-1$, т.е. хомотетијата χ е централната симетрија σ_O .

Обратно, при секоја централна симетрија σ_O кружниците (O, r) се неподвижни.

2. Нека триаголниците ABC и $A'B'C'$ се слични. Во кој случај постои хомотетија χ при која триаголникот ABC се пресликува во $A'B'C'$?

Одговор. Според задача 3 од претходниот параграф, таква хомотетија постои ако и само ако правите AA' , BB' и CC' минуваат низ една иста точка.

3. Состав на две хомотетии

Нека χ_1 и χ_2 се хомотетии со центри O_1 , O_2 и коефициенти k_1 , k_2 соодветно. Се прашуваме што претставува трансформацијата ϕ дефинирана со

$$\phi(A) = \chi_2(\chi_1(A)). \quad (3)$$

Трансформацијата ϕ уште се нарекува и состав на хомотетите χ_1 и χ_2 и се означува со $\chi_1 \circ \chi_2$.

Прво, да претпоставиме дека $O_1=O_2=O$. Ако $\chi_1(A)=A'$,

$$\chi_2(A_1)=A'$$

тогаш $\phi(A)=A'$ и, притоа,

$$\vec{OA}' = \kappa_2 \vec{O}A_1 = \kappa_1 \kappa_2 \vec{OA}.$$

Значи, ако χ е хомотетија со центар O и коефициент $\kappa_1 \kappa_2$,

$$\text{тогаш } \chi(A)=A', \text{ т.е. за секоја точка } A \text{ важи}$$

$$\phi(A) = \chi(A),$$

што значи $\phi=\chi$.

Следствено, состав на две хомотетии χ_1, χ_2 со ист центар O и коефициенти κ_1, κ_2 соодветно е хомотетија со истокот центар O и коефициент $\kappa_1 \kappa_2$.

Нека, сега, $O_1 \neq O_2$ и нека A и B се две различни точки.

Ако $\chi_1(A)=A_1$, $\chi_1(B)=B_1$, $\chi_2(A_1)=A'$, $\chi_2(B_1)=B'$, тогаш $\phi(A)=A'$,

$\phi(B)=B'$ и, притоа,

$$\vec{A}'\vec{B}' = \kappa_2 \vec{A}_1\vec{B}_1 = \kappa_1 \kappa_2 \vec{A}\vec{B}'.$$

Според задачата 3 од §2, следува дека:

-ако $\kappa_1 \kappa_2 \neq 1$, тогаш постои хомотетија χ , таква што $\chi(A)=A'$, $\chi(B)=B'$, што значи $\phi=\chi$;

-ако $\kappa_1 \kappa_2 = 1$, тогаш ϕ е трансляција.

Следствено, составот $\phi=\chi_1 \circ \chi_2$ при $O_1 \neq O_2$ е хомотетија ако и само ако $\kappa_1 \kappa_2 \neq 1$.

Задачи

1. Нека χ_1, χ_2 се две хомотетии со центри O_1, O_2 ($O_1 \neq O_2$) и коефициенти κ_1, κ_2 ($\kappa_1 \kappa_2 \neq 1$) соодветно. Да се најде центарот O_3 на хомотетијата $\chi_3=\chi_1 \circ \chi_2$.

Решение. Нека $\chi_2(O_1)=O'_1$; тогаш ќе имаме

$$\chi_3(O_1) = \chi_2(\chi_1(O_1)) = \chi_2(O_1) = O'_1.$$

Од $\chi_2(O_1)=O'_1$ следува дека точките O_2, O_1 и O'_1 се колинеарни, а од $\chi_3(O_1)=O'_1$ следува дека точките O_3, O_1 и O'_1 се колинеарни. Значи, точките O_1, O_2 и O_3 се колинеарни и, притоа, важи $\vec{O}_3\vec{O}'_1 = \kappa_1 \kappa_2 \vec{O}_3\vec{O}_1$. Понатаму имаме:

$$\begin{aligned} \vec{O}_1\vec{O}'_1 &= \vec{O}_2\vec{O}'_1 - \vec{O}_2\vec{O}_1 = \kappa_2 \vec{O}_2\vec{O}_1 - \vec{O}_2\vec{O}_1 = (\kappa_2 - 1) \vec{O}_2\vec{O}_1, \\ \vec{O}_1\vec{O}'_1 &= \vec{O}_3\vec{O}'_1 - \vec{O}_3\vec{O}_1 = \kappa_1 \kappa_2 \vec{O}_3\vec{O}_1 - \vec{O}_3\vec{O}_1 = (\kappa_1 \kappa_2 - 1) \vec{O}_3\vec{O}_1. \end{aligned}$$

од каде што следува дека

$$(\kappa_2 - 1) \vec{O}_2\vec{O}_1 = (\kappa_1 \kappa_2 - 1) \vec{O}_3\vec{O}_1,$$

i.e.

$$\vec{O}_3\vec{O}_1 = \frac{\kappa_2 - 1}{\kappa_1 \kappa_2 - 1} \vec{O}_2\vec{O}_1.$$

4. Хомотетија на кружници

Во претходниот дел видовме дека при хомотетија, кружница се пресликува во кружница, т.е. ако χ е хомотетија со центар O и коефициент κ тогаш кружниката (S, r) се пресликува во кружниката (S', r') каде што

$$S' = \chi(S), \quad r' = |\kappa|r. \quad (6)$$

Овде ќе покажеме дека кои било две кружници се хомотетични, т.е. дека постои хомотетија која едната кружница ја пресликува во другата.

Нека $\kappa_1(S_1, r_1)$ и $\kappa_2(S_2, r_2)$ се две дадени кружници. Ако постои хомотетија χ при која кружниката κ_1 се пресликува во κ_2 , тогаш нејзиниот коефициент, според (6), мора да биде или r_2/r_1 или $-r_2/r_1$. Од $S_2=\chi(S_1)$, пак, следува дека центарот O_2 на хомотетијата χ мора да лежи на централната линија $S_1 S_2$.


Да ги разгледаме двата случаја кога кружниците: 1° се концентрични и 2° не се концентрични.

1° Ако $S_1 = S_2 = S$ (прт. 8), тогаш хомотетијата χ со центар S и коефициент r_2/r_1 ја пресликува кружниката κ_1 во κ_2 .

2° Да претпоставиме, сега, дека $S_1 \neq S_2$ и $r_1 \neq r_2$ (прт. 9).

Нека C е произволна точка од кружниката κ_2 , а AB дијаметарот на κ_1 што е паралелен со правата $S_2 C$ и нека $O_1=S_1 S_2 \cap AC$, $O_2=S_1 S_2 \cap BC$. Тогаш хомотетијата χ_1 со центар O_1 и коефициент r_2/r_1 , односно хомотетијата χ_2 со центар O_2 и коефициент $-r_2/r_1$, ја пресликува кружниката κ_1 во кружниката κ_2 .

Ако, пак, $r_1=r_2$, тогаш правата AC ќе биде паралелна со правата S_1S_2 , но правата BC ја сече S_1S_2 , па при хомотетијата χ_2 кружницата K_1 ќе се преслика во кружницата K_2 .



Црт. 8

Со тоа покажаме дека кога било две кружници се хомотетични. Центарот на хомотетијата, во тој случај, се вика и центар на сличност (или центар на хомотетија) на тие кружници.

Од горното разгледување следува дека две концентрични кружници имаат само еден центар на сличност, а неконцентричните кружници може да имаат или два или еден центар на сличност. Во случајот кога кружниците имаат два центра на сличност, единиот се вика надворешен (O_1 на црт. 9), а другиот внатрешен центар на сличност (O_2 на црт. 9).

Интересно е да се забележи, дека, ако т.е заедничка тангента на две кружници, тогаш таа е или паралелна со централната линија или минува низ еден од центрите на сличноста.

Според тоа, за да ги конструираме заедничките тангенти на две кружници, треба да ги најдеме нивните центри на сличност и од нив да ги повлечеме тангентите на едната од кружниците.


Сега, ќе разгледаме една многу интересна задача, иако темка, која ќе ја користиме во наредната глава за решавање на некои од задачите на Аполониј.

Имено, нека кружниците $K_i(O_i, r_i)$, $i=1,2,3$, се со различни неколинеарни центри и со различни радиуси. Ке ги определите заемните положби на центрите на сличност на тие кружници земени две по две.

Решение. Бидејќи $O_1 \neq O_2$ и $r_1 \neq r_2$ постојат хомотетите χ_{12} и χ'_{12} со центри S_{12} и S'_{12} и коефициенти r_2/r_1 и $-r_2/r_1$ соодветно при кои кружницата K_1 се пресликува во кружницата K_2 .

Црт. 9

Слично, постојат хомотетите χ_{23} и χ'_{23} со центри S_{23} и S'_{23} и коефициенти r_3/r_2 и $-r_3/r_2$ при кои кружницата K_2 се пресликува во кружницата K_3 , а при хомотетите χ_{13} и χ'_{13} со центри S_{13} и S'_{13} и коефициенти r_3/r_1 и $-r_3/r_1$ соодветно кружницата K_1 се пресликува во кружницата K_3 (црт. 10). Точкиите S_{12} и S'_{12} лежат на правата O_1O_2 , S_{23} и S'_{23} на O_2O_3 , а S_{13} и S'_{13} на O_1O_3 .



Црт. 10

Бидејќи $\frac{r_2}{r_1} \cdot \frac{r_3}{r_2} = \frac{r_3}{r_1} \neq 1$, следува дека составот $\phi = \chi_{12} \circ \chi_{23}$ е хомотетија со позитивен коефициент $\frac{r_3}{r_1}$ и, притоа, $\phi(K_1) = K_3$,

т.е. $\phi(K_1) = K_3$, а според задача 1 од претходниот параграф, следува дека точките S_{12} , S_{23} и S_{13} се колинеарни. На ист начин се покажува дека:

- точките S_{12} , S'_{23} и S'_{13} се колинеарни,
- точките S'_{12} , S_{23} и S_{13} се колинеарни,
- точките S'_{12} , S_{23} и S_{13} се колинеарни.

Следствено, $S_{12}, S'_{12}, S_{23}, S'_{23}, S_{13}$ и S'_{13} се шест точки кои формираат четири прави, така што на секоја од тие прави лежат по три точки.

$$(1) \quad \vec{TH} = -\frac{1}{2}\vec{TN}, \quad \text{т.е.}$$


5. Примена на хомотетијата

Ќе решиме неколку задачи кои, во извесна мера ќе ја илустрираат примената на хомотетијата и, посебно, примената на хомотетијата за решавање на некои од задачите на Аполониј.

1. Да се покаже дека тежиштето T , ортоцентарот H и центарот O на описаната кружница за кој било триаголник ABC се колинеарни.

Решение. Нека ABC (прт. 11) е произволен триаголник. Како што знаеме, тежиштето T ги дели тежишните линии AA_1, BB_1 и CC_1 во однос $2:1$. Од тоа следува дека

$$\vec{TA} = -2\vec{TA}_1, \quad \vec{TB} = -2\vec{TB}_1, \quad \vec{TC} = -2\vec{TC}_1.$$



Прт. 11

Тоа значи дека, ако χ е хомотетија со центар T и коефициент $-\frac{1}{2}$, тогаш

$$\chi(A) = A_1, \quad \chi(B) = B_1, \quad \chi(C) = C_1,$$

т.е. триаголниците ABC и $A_1B_1C_1$ се хомотетични со коефициент $-\frac{1}{2}$.

Да ја најдеме точката $\chi(H)$. Ако CC' е висина на триаголникот ABC , спуштена од темето C , тогаш правата CC' ќе се преслика со χ во права што е паралела со неа и минува низ точката C_1 , т.е. во симетралата на страната AB (зашто?). Аналогно важи

и за висините AA' и BB' . Од тоа следува дека $\chi(H)=O$, што значи $\vec{TH} = 2\vec{TO}$.


Од равенството (1) следува дека точките T, O и H се колинеарни.

Уште повеќе, точката T ја дели отсечката HO во однос $2:1$.

Правата на која лежат точките T, O и H се вика Ојлерова права.

✓₂. Дадена е точка A и две прави p, q кои се сечат надвор од листот на кој пртаме. Да се конструира правата $a=AM$, каде што $M=p \cap q$.

Решение. За да ја најдаме правата a доволно е, на листот на кој пртаме да најдеме една точка, којашто е колинеарна со точките A и M . При секоја хомотетија со центар A , правата a се пресликува во себе, па, значи, ако избереме хомотетија χ со центар во A и таков коефициент што точката $\chi(M)=M'$ е на листот на кој пртаме, тогаш бараната права ќе биде правата AM' . Секако, коефициентот на хомотетијата треба да биде помал од 1.



Прт. 12

Да избереме произволна точка P од правата p и точка P' колинеарна со A и p (прт. 12). Нека χ е хомотетија со центар A и коефициент $\frac{AP'}{AP}$. Ако $\chi(p)=p'$, $\chi(q)=q'$, тогаш $\chi(M)=M'$ ќе биде точката $p' \cap q'$.


✓₃. Во даден триаголник ABC да се впише квадрат, така што две негови темиња да лежат на основата AB , а другите две на BC и CA соодветно.

Решение. А и а л и з а. Да претпоставиме дека задачата е решена и $KLMN$ е бараниот квадрат (прт. 13). Ако χ е хомотетија


со центар во A и некој коефициент $k \neq 1$, тогаш квадратот $KLMN$ ќе се преслика во квадратот $K'L'M'N'$ при што K' и L' ќе лежат на правата AB , а N' ќе лежи на правата AC (зашто?). Точкита, так, M' нема да лежи на правата BC (зашто?). Ако точката N' ја избереме произволно на страната AC , квадратот $K'L'M'N'$ може лесно да се конструира (прт. 13). Бидејќи M, M' и центарот A на хомотетијата се колinearни, следува дека M е пресечната точка на правите AM' и BC .

Конструкција. Да избереме произволна точка N' на страните AC . Нека K' е ортогоналната проекција од N' на правата AB , и нека $K'L'M'N'$ е квадрат со страна $K'N'$. Ако M е пресечната точка на правите AM и BC , а L е ортогоналната проекција на M врз AB , тогаш бараниот квадрат е квадратот $KLMN$ со страна MN .

Доказ. Дека конструкцијата е правилна след: за од тоа, што хомотетијата со центар A и коефициентот $\overline{AM}:\overline{AM}'$ о пресликува квадратот $K'L'M'N'$ во квадратот $KLMN$.




Прт. 13



Прт. 14

Дискусија. За да можеме да ја спроведеме дискусијата за тоа кога задачата има решенија, а кога не, треба предвидено да се доловориме што ќе ни значат зборовите „квадрат вписан во триаголник“.

Вообичаено е, под тие зборови да се подразбира квадрат со темива на страните од триаголникот. Во тој случај, задачата има единствено решение, ако имена од аглите $a=x_A$, $b=x_B$ не е тап, а ќе нема решеније, ако некој од тие агли е тап (зашто?).



Прт. 15

Нека $S=b \cap c$ и нека $k(O, r)$ е бараната кружница. Бидејќи k ги допира правите b и c најзиниот центар O ќе лежи на симетралата s на овој агол образуван од правите b и c во кој лежи точката A . Ако x е хомотетија со центар во S и произволен коефициент, тогаш $x(a)=a$, $x(b)=b$, $x(c)=\overline{k}$ ќе биде кружница што

но, под „квадрат вписан во триаголник“ може да се подразбере и „квадрат, чии темиња лежат на страните од триаголникот или на нивните продолженија“ (според тоа, квадратот не мора да лежи во триаголникот). Во овој случај, задачата секогаш има решение; притоа, таа има, обично, две решенија (прт. 14), но може да има и само едно (кој е тој случај?).

Да забележиме дека под „многуаголник Γ_1 вписан во многуаголник Γ_2 “ често се подразбира многуаголник Γ_1 , таков, што сите негови темиња да лежат на страните или на продолженијата од страните на многуаголникот Γ_2 ; притоа, Γ_1 не мора да лежи во Γ_2 .

Сега ќе ги решиме оние задачи од задачите на Аполониј, коишто можат да се решат со помош на хомотетија. Притоа, нумериците на задачите е иста со онаа од стр. 2.


Задача 5 (A, b, c). Овде ќе го разгледаме само најодиштиот случај кога правите b и c се сечат, а точката A не лежи на ниедна од правите b и c и не лежи на симетралите од аглите што ги образуваат правите b и c (прт. 15).

ги допира правите $a=x(a)$ и $b=x(b)$. Значи, за да ја конструираме кружницата k , доволно е да конструираме произволна кружница — што ги допира правите b и c , а потоа да го определиме коефициентот на хомотетијата χ , така што $\chi^{-1}(\bar{k})=k$. Од оваа дискусија произлегува следнава конструкција.

На симетралата s на оној агол образуван од правите b и c во кој лежи точката избирааме произволна точка \bar{O} и ја конструираме кружницата $\bar{k}(\bar{O}, \bar{r})$ којашто ти допира правите b и c . Нека A_1 и A_2 се пресечните точки на кружницата \bar{k} со правата SA . Ако χ_1 и χ_2 се хомотетиите со центар во S и коефициенти $\bar{OA}_1 : OA_1$ и $\bar{OA}_2 : OA_2$ соодветно, тогаш ќе имаме $\chi_1(A_1)=A$ и $\chi_2(A_2)=A$. Значи, кружниците $\chi_1(\bar{k})=k'$ и $\chi_2(\bar{k})=k''$ ќе минуваат низ точката A и ќе ги допираат правите b и c . Нивните центри ќе бидат точките $O'=x_1(\bar{O})$ и $O''=x_2(\bar{O})$. Доволно е низ точката A да се повлечат прави паралелни со правите \bar{OA}_1 и \bar{OA}_2 соодветно и нивните пресечни точки со правата s ќе бидат точките O' и O'' .

Задачата има точно две решенија.

Задача 3 (a,b,c). Ке го разгледаме најопштиот случај кога точките A и B лежат во иста полурамнини во однос на правата s и правата AB не е паралелна со правата c (прт. 16).




Прт. 16

Да претпоставиме дека задачата е решена и $k(O, r)$ е бараната кружница којашто кружницата $k_1(O_1, r_1)$ ја допира во точката M . Точката M е центар на сличност за кружниците k и k_1 , т.е. постои хомотетија χ со центар во M при која кружницата k се пресликува во k_1 . За да го најдеме коефициентот на χ доволно е да ја најдеме точката $\chi(S)$, $S=a \cap b$. Правите a и b се тангентни на кружницата k , па правите $a'=\chi(a)$ и $b'=\chi(b)$ ќе бидат тангенти на k , паралелни со правите a и b соодветно.

Нивната пресечна точка S' може да биде точката $\chi(S)$, па коефициентот на хомотетијата χ ќе биде $\overline{MS} : \overline{MS'}$. Значи, точката S' може да ја најдеме, а потоа точката M (допирната точка на k и k_1) ќе припаѓа на пресекот на кружницата k_1 со правата SS' . Центарот O на бараната кружница k ќе биде точката $O_1 M \cap S$, каде што s е една од симетралите на агите образувани од правите a и b .

Прт. 16

Задача 8 (a,b,k₁). И овде ќе го разгледаме најопштиот случај кога правите a и b се сечат и центарот O_1 на кружница $(A, c'c)$. Во случајот кога c' и c се меѓусебно паралелни задачата се решава без хомотетија (види задача 5, стр. 19).



Прт. 17

Видјејќи на кружницата k , може да се конструираат две тангенти паралелни со правата a и две тангенти паралелни со правата b , за точката S' може да избереме четири различни точки. Правите SS' ја сечат кружницата k , во најмногу две точки, што значи дека задачата ќе има најмногу осум решенија.


Г л а з а III

Г Е О М Е Т Р И Ј
Н А
К Р У Ж Н И Ц А

1. Степен на точка во однос на кружница

Нека е дадена кружница $k(O, r)$ и една произволна точка M . Низ M повлекуваме произволна права, којашто ја сече кружница k во точките A и B . Ке покажеме дека производот $\overline{MA} \cdot \overline{MB}$ не зависи од изборот на правата a низ точката M , т.е. дека има константна вредност.

На прт. 1 се представени трите можни положби на точката M во однос на кружницата k . Ке ги разгледаме посебно сите три случаи.



Прт. 1

Ако точката M лежи на кружницата $k(O, r)$ (прг. 1 a),
тогаш M се совпаѓа со една од точките A и B , па еден од броевите $\overline{MA} \cdot \overline{MB}$ е кула, што значи дека $\overline{MA} \cdot \overline{MB} = 0 = \text{const.}$

Нека M е надворешна точка за кружницата $k(O, r)$ и нека t е една од тангентите на k повлеченी од M , којашто ја допира кружницата k во точката T (прг. 1 b)). Триаголниците MAT и MTB имаат заеднички агол кај темето M , а аглите MTA и MTB се

перифериски над лакот ТА, што значи дека и тие се еднакви.

Според тоа, $\Delta MAT \sim \Delta MTC$, од каде што следува

$$\frac{MA}{MT} = \frac{MC}{MT} = \frac{MC}{MB},$$

т.е.

$$\overline{MA} \cdot \overline{MB} = \overline{MT}^2 = d^2 - r^2 = \text{const.}$$


На крајот, нека точката М е внатрешна за кружницата $k(O, r)$ (прт. 1 а)). Низ точката М да повлечеме тетива CD нормална на правата OM. За триаголниите MCA и MBD имаме: $\angle MAC = \angle MBD$, како вкрстени агли, и $\angle MCA = \angle MBD$, како перифериски агли над лакот AD. Значи, овие триаголници се слични, од каде што следува

$$\frac{MA}{MC} = \frac{MD}{MB},$$

т.е.

$$\overline{MA} \cdot \overline{MB} = \overline{MC} \cdot \overline{MD} = \overline{MD}^2 = r^2 - d^2 = \text{const.}$$

Следствено, производот $\overline{MA} \cdot \overline{MB}$ не зависи од изборот на правата а низ точката M, туку зависи само од радиусот r на кружницата $k(O, r)$ и од растојанието $d=OM$ од точката M до центарот O на кружницата $k(O, r)$, т.е. зависи само од точката M и кружницата $k(O, r)$. Бројот $d^2 - r^2$ ќе го наречеме степен на точката M во однос на кружницата $k(O, r)$. Ако M лежи на k, тогаш степенот е нула; ако M е надворешна за k, тогаш степенот е позитивен, а ако M е внатрешна за k, тогаш степенот е негативен.




Прт. 2

Да забележиме дека во случајот кога точката M е надворешна за кружницата $k(O, r)$ степенот на M во однос на k е еднаков со \overline{MT}^2 и, притоа, кружницата (M, \overline{MT}) ортогонално ја сече кружницата $k(O, r)$, (прт. 2).

Задачи

За поедноставна формулатија на задачите што овде ќе ги решиме, а кои полошна ќе ги користиме за решавање на некои од задачите на Аполониј, ќе воведеме два поима.

Нека $k_1(O_1, r_1)$ и $k_2(O_2, r_2)$ се две кружници, нека S е центар на сличност на k_1 и k_2 и нека χ е хомотетијата со центар во S, така што $\chi(k_1) = k_2$. Ако P е права низ S која ги сече кружниците k_1 и k_2 во точките P_1, P_2 и Q_1, Q_2 соодветно и ако $\chi(P_1) = Q_1$, $\chi(P_2) = Q_2$, тогаш точките P_1 и Q_2 (P_2 и Q_1) се викаат антихомотетични во однос на центарот S (прт. 3)



Прт. 3

Нека $k_1(O_1, r_1)$ и $k_2(O_2, r_2)$ се две кружници и нека $k(O, r)$ е кружница што ги допира k_1 и k_2 . Ќе велиме дека k ги допира k_1 и k_2 на ист начин ако k ги допира и двете однадвор или и двете однагре. Ако, пок, k ја допира едната кружница однадвор, а другата однагре, тогаш ќе велиме дека k ги допира k_1 и k_2 на различен начин.

✓. Производот на растојанијата од центарот на сличност на две кружници до две антихомотетични точки е константен.

Решение. Нека S е надворешниот центар на сличност на кружниците $k_1(O_1, r_1)$ и $k_2(O_2, r_2)$, $r_1 \neq r_2$, и нека P_1 и Q_2 (P_2 и Q_1) се антихомотетични точки (прт. 3); тогаш коефициентот на хомотетијата χ , така што $\chi(k_1) = k_2$, е

$$m = \frac{\overline{SQ}_1}{\overline{SP}_1} = \frac{\overline{SQ}_2}{\overline{SP}_2},$$

па ќе имаме

$$\overline{SP}_1 \cdot \overline{SQ}_2 = \overline{SP}_1 \cdot \overline{SP}_2 \cdot \frac{\overline{SQ}_2}{\overline{SP}_2} = \overline{SP}_1 \cdot \overline{SP}_2 \cdot m = \text{const.}$$

зашто $\overline{SP}_1 \cdot \overline{SQ}_2$ е степенот на точката S во однос на кружницата k_1 .


Слично добиваме дека $\overline{SP}_2 \cdot \overline{SQ}_1 = \text{const.}$, а со исти расулувава се докажува и во случајот кога S е внатрешниот центар на сличност.

→ У3. Нека $k(O, r)$ е кружница што ги допира кружниците $k_1(O_1, r_1)$ и $k_2(O_2, r_2)$;

в) ако k ги допира k_1 и k_2 на ист начин, тогаш допирните точки на k со k_1 и k_2 се антихомотетични во однос на надворешниот центар на сличност на k_1 и k_2 ;

г) ако k ги допира k_1 и k_2 на различен начин, тогаш допирните точки на k со k_1 и k_2 се антихомотетични во однос на внатрешниот центар на сличност на k_1 и k_2 .

Решение. д) Нека кружницата k ги допира кружниците k_1 и k_2 соодветно во точките P_1 и Q_2 на различен начин (прт. 4).



Прт. 4

Тогаш $\chi_{O_1 P_1 P_2} = \chi_{O_2 Q_2 Q_1} = \chi_{O_2 Q_1 Q_2} = \chi_{O_1 O_2 O_1} = \chi_{O_2 O_1 O_2}$, од каде што следува дека правите $O_1 P_1$ и $O_2 Q_2$ се меѓусебно паралелни, па точките P_1 и Q_2 се хомотетични, а P_1 и Q_2 антихомотетични во однос на внатрешниот центар на сличност.

→ У3. Секој центар на сличност на кружниците k_1 и k_2 има исти степен во однос на секоја кружница k што ги допира кружниците k_1 и k_2 .


Решение. Според претходната задача, ако допирните точки на k со k_1 и k_2 се P_1 и Q_2 соодветно, тогаш P_1 и Q_2 се антихомотетични во однос на центарот на сличноста S (прт. 3 и 4). Според задачата 1, производот $\overline{SP}_1 \cdot \overline{SQ}_2$ е константен, а тоа е степенот на точката S во однос на кружницата k .

Овде е претпоставено дека $r_1 \neq r_2$, т.е. дека надворешниот центар на сличност на k_1 и k_2 постои.

→ У3. Ако кружницата k минува низ антихомотетични точки во однос на центар на сличност на кружниците k_1 и k_2 и k ја допира едната, тогаш k ја допира и другата.

Решението на оваа задача го оставаме на читателот.

Задача 3 (A,B,C). Ке го разгледаме најопштиот случај кога точките A, B лежат во иста полурамнинка во однос на правата C и кога правата AB не е паралелна со правата C (прт. 5).



Прт. 5

Степенот на точката $M = AB \cap C$ во однос на произволна кружница што минува низ точките A и B е $\overline{MA} \cdot \overline{MB}$. Ако $\overline{k}(\overline{O}, \frac{1}{2}\overline{AB})$ и ако t е

тантгента \bar{k} повлечена од M , тогаш $\bar{M}\bar{T}^2$ е степенот на M во однос на \bar{k} , а според тоа, и степенот на M во однос на бараната кружница. Тоа значи дека пресечните точки P_1 и P_2 на правата с со кружницата (M, \bar{MT}) ќе бидат допирни точки на правата с со кружниците што минуваат низ точките A и B . Ако r_1 и r_2 се прави нормали на с во точките P_1 и P_2 соодветно и ако s е симетралата на отсеката AB , тогаш $s \cap r_1 = 0'$ и $s \cap r_2 = 0''$ се центри на бараните кружници. Во овој случај запачата има две решенија.

2. Радикална оска и радикални центри

Нека се дадени две кружници $K_1(O_1, r_1)$ и $K_2(O_2, r_2)$. Го јазарме геометриското место Γ од точки кои имаат ист степен во однос на двете кружници K_1 и K_2 .


Ако $M \in \Gamma$, тогаш $\overline{O_1M}^2 - r_1^2 = \overline{O_2M}^2 - r_2^2$, т.е.

$$\overline{OM}_1^2 - \overline{OM}_2^2 = r_1^2 - r_2^2. \quad (1)$$

Обратно, ако за точката M е исполнето равенството (1), тогаш

Мег. Значи, Мег ако и само ако е исполнето равенството (1).

Ако $O_1 = O_2$, тогаш од (1) следува дека и $r_1 = r_2$, т.е. кружниците K_1 и K_2 се совпаѓаат. Затоа, ќе претпоставиме дека $O_1 \neq O_2$ (прт. 6).



Нека, сега, M е произволна точка што не лежи на правата O_1O_2 и нека M' е ортогоналната проекција од M врз O_1O_2 . Од правоаголните триаголници $MM' O_1$ и $MM' O_2$ следува

$$\overline{O_1M}^2 - \overline{O_1M'}^2 = \overline{O_2M}^2 - \overline{O_2M'}^2,$$

т.е.

$$\overline{O_1M}^2 - \overline{O_2M}^2 = \overline{O_1M'}^2 - \overline{O_2M'}^2,$$

што значи дека Мег ако и само ако $M' \in \Gamma$. Но, на правата O_1O_2 постои единствена точка $R \in \Gamma$, па, значи, геометриското место Γ е права што минува низ точката R и е нормална на правата O_1O_2 . Оваа права се нарекува **радикална оска** за кружниците K_1 и K_2 .

Во случај кружниците K_1 и K_2 да се сечат во точките A и B , радикалната оска ќе биде правата AB (прт. 7), а во случај кога кружниците се допираат во точката T радикалната оска ќе биде заедничката тантгента t на K_1 и K_2 во точката T (прт. 8). Ако K_1 и K_2 немаат заеднички точки, тогаш нивната радикална оска ќе нема заеднички точки со ниедна од кружниците. Подоцна ќе дадеме единствен начин за конструција на радикалната оска на две кружници што немаат заеднички точки.

Прт. 6

Права да видиме дали постои точка R од правата O_1O_2 која што има ист степен во однос на K_1 и K_2 , т.е. која припаѓа на Γ .

Нека R е точка од правата O_1O_2 , нека $r_1 \geq 2$ и нека $m = \overline{O_1O_2}$, $\overline{O_1R} \dots$. Ако $R \notin \Gamma$, тогам

$$\overline{O_1R}^2 - \overline{O_2R}^2 = r_1^2 - r_2^2. \quad (2)$$

Од $r_1 \geq r_2$ следува дека $\overline{O_1R} \geq \overline{O_2R}$, што значи дека R лежи на полуправата O_1O_2 со почеток во O_1 . Од (2) добиваме

$$x^2 - (m-x)^2 = r_1^2 - r_2^2,$$

$$2mx = m^2 + r_1^2 - r_2^2.$$

Бидејќи $O_1 \neq O_2$, следува $m \neq 0$, па последната равенка има единствено решение

$$x = \frac{1}{2m}(m^2 + r_1^2 - r_2^2).$$

Ова означува дека на полуправата O_1O_2 постои единствена точка R што припаѓа на Γ , а според тоа, точката R е единствена и од правата O_1O_2 .

Нека, сега, M е произволна точка што не лежи на правата O_1O_2 и нека M' е ортогоналната проекција од M врз O_1O_2 . Од правоаголните триаголници $MM' O_1$ и $MM' O_2$ следува


$$\overline{O_1M}^2 - \overline{O_1M'}^2 = \overline{O_2M}^2 - \overline{O_2M'}^2,$$

т.е.

$$\overline{O_1M}^2 - \overline{O_2M}^2 = \overline{O_1M'}^2 - \overline{O_2M'}^2,$$

што значи дека Мег ако и само ако $M' \in \Gamma$. Но, на правата O_1O_2 постои единствена точка $R \in \Gamma$, па, значи, геометриското место Γ е права што минува низ точката R и е нормална на правата O_1O_2 .

Оваа права се нарекува **радикална оска** за кружниците K_1 и K_2 .



Прт. 7

Да забележиме уште тоа дека радикалната оска на две точки O_1 и O_2 , како кружници со радиус нула, е симетралата на отсечката O_1O_2 , а, исто така, радикалната оска на две кружници со центар O_1 и O_2 и со ист радиус е симетралата на отсечката O_1O_2 .


Нека, сега, се дадени три кружници k_1 (O_1, r_1), k_2 (O_2, r_2), k_3 (O_3, r_3).

Да ги најдеме точките од рамнината, ако такви постојат, кои имаат ист степен во однос на трите кружници. Да ги означиме со P_{12} , P_{23} , P_{31} радикалните оски на k_1 и k_2 , k_2 и k_3 , k_3 и k_1 соодветно. Значи, ако постои точка P која има ист степен во однос на k_1, k_2 и k_3 , таа мора да лежи на радикалните оски P_{12} и P_{23} .


Ако центрите O_1, O_2, O_3 на кружниците не се колинеарни (прт. 9), тогаш $P_{12} \cap P_{23}$ таа ќе има ист степен во однос на k_1, k_2 и k_3 , што значи дека и P , минува низ P . Следствено, во овој случај постои единствена точка P која има ист степен во однос на k_1, k_2 и k_3 и таа точка се нарекува **радикален центар** на k_1, k_2 и k_3 .

Ако центрите O_1, O_2 и O_3 на кружниците се колинеарни, тогаш сите три радикални оски се меѓусебно паралелни и, притоа, или сите три се меѓусебно различни или, пак, сите три се совпаѓаат (прт. 10).

Да забележиме дека наместо за радикален центар на три кружници може да зборуваме за радикална оска на две кружници




Прт. 8



Прт. 9

и точка, на една кружница и две точки како и за радикален центар на три неколинеарни точки. Во последниот случај, радикалниот центар на трите неколинеарни точки A, B, C ќе биде центарот на описаната кружница околу триаголникот ABC .



Прт. 11

Прт. 12

Радикалниот центар на три кружници ќе то искористиме за конструирање на радикалната оска на две кружници што немаат заедничка точка. Нека k_1 и k_2 се две кружници што немаат заедничка точка (прт. 11). Да напртаме произволна кружница k_3 која ги сече кружниците k_1 и k_2 . Пресечната точка на радикалните оски P_{13} и P_{23} е радикалниот центар P на k_1, k_2 и k_3 , па радикалната оска P_{12} ќе биде правата низ P нормална на O_1O_2 .


Ако, пак, е дадена кружницата k_1 (O_1, r_1) и точка A што не лежи

на k_1 , тогаш радикалната оска r на k_1 и A ја конструираме на следниов начин. Низ точката пртаме произволна кружница k_3 што сече кружницата k_1 (прт. 12). Радикалната оска на A и k_3 ќе биде тангентата t на k_3 во A , па радикалниот центар P на k_1, k_3 и A ќе биде точката $P_1 \cap t$. Сега, радикалната оска r на k_1 и A ќе биде правата низ P нормална на правата O_1A .

Задачи

→ **VII.** Да се докаже дека радикалната оска на две кружници што немаат заеднички точки и делот од радикалната оска на две кружници што се сечат, а е надворешен за нив, е геометриското место на центрите на кружниците коишто ортогонали ги сечат дадените кружници.

Решение. Нека $k(O, r)$ е кружница чиј центар O лежи на радикалната оска r на кружниците k_1 и k_2 и радиус $r = \overline{OT}_1 = \overline{OT}_2$ (прт. 13). Бидејќи радиусите на k , повлечени во T_1 (T_2) се тангенти на k_1 (k_2) следува дека k и k_1 (k и k_2) се сечат под прав агол, т.е. k ги сече ортогонално кружниците k_1 и k_2 .




Прт. 13

Обратно, ако кружницата $k(O, r)$ ги сече ортогонално k_1 и k_2 , тогаш тангентите растојанија од O до k_1 и k_2 се еднакви, т.е. О има ист степен во однос на k_1 и k_2 . Значи, O лежи на радикалната оска r на k_1 и k_2 .

→ **VII.** Ке велиме дека кружницата k ја прекојкува кружницата k' , ако k ја сече k' во дијаметралне спротивни точки. Да се докаже дека внатрешниот дел од радикалната оска r на кружниците k_1 и k_2 што се сечат е геометриското место на центрите на кружниците, секоја од кои кружниците k_1 и k_2 ја половат (прт. 14 б)).

Решение. Нека кружницата (O, r) ја сече кружницата $k_1(O_1, r_1)$ во дијаметрално спротивни точки A и B (прт. 14 а)). Тогаш од правоаголниот триаголник CAD имаме $\overline{O_1C} \cdot \overline{O_1D} = \overline{OA}^2$, т.е. $(r-d)(r+d) = r_1^2$, од каде што добиваме

$$r^2 = d^2 + r_1^2, \quad d = \overline{O_1O_2}.$$


Прт. 14

Да го најдеме сега геометриското место на центрите на кружниците коишто се половени од две дадени кружници k_1 и k_2 . Пред се, јасно е дека ако M е центар на таква кружница, тогаш М мора да биде внатрешна точка за k_1 и k_2 , па такви кружници ќе постојат ако и само ако k_1 и k_2 се сечат. Според претходното, ќе имаме

$$r_1^2 = d_1^2 + r^2, \quad r_2^2 = d_2^2 + r^2,$$

од каде добиваме:

$$r^2 = r_1^2 - d_1^2 = r_2^2 - d_2^2,$$

т.е.

$$d_1^2 - r_1^2 = d_2^2 - r_2^2.$$


Последното равенство значи дека точката M има ист степен во однос на k_1 и k_2 , т.е. М лежи на радикалната оска на k_1 и k_2 .

Следствено, бараното геометриско место е отсечката AB без точките A и B .

\checkmark \checkmark 3. Нека k_1, k_2 и k_3 се три кружници коишто не минуваат низ една иста точка и центрите не им се колinearни. Да се докаже дека постои единствена кружница којашто сите три ги сече ортогонално или, пак, сите три ја преполовуваат.

Решение. Нека P е радикалниот центар на кружниците k_1, k_2 и k_3 ; тогаш или P е надворешна точка за сите три кружници или, пак, е внатрешна. Во првиот случај, степенот на P во однос на k_1, k_2 и k_3 е позитивен; да го означиме со m^2 ; тогаш, според задачата 1, кружницата (P, m) ги сече сите t_1 кружници ортогонално. Во вториот случај, степенот на P во однос на k_1, k_2 и k_3 е негативен; да го означиме со $-n^2$; тогаш според задачата 2, кружницата (P, n) сите три кружници k_1, k_2, k_3 ја половава.

\checkmark задача 4 (A, B, k_1). Низ точките A и B да пољечеме произволна кружница k' , којашто кружницата k_1 ја сече, на пример, во точките C и D (прт. 15); тогаш радикалната оска на k' и k_1




Прт. 15

е правата CD , а радикалната оска на k' и бараната кружница k' е правата AB . Значи, пресечната точка P на правите AB и CD , ако постои, е радикалниот центар на k', k_1 и k_1 , од каде што сле-

дува дека радикалната оска на k и k_1 ќе биде тангентата на k_2 што минува низ P .

Следствено, ако ги повлечеме тангентите t_1 и t_2 (ако такви постојат) од P на k_1 , тогаш допирните точки T_1 и T_2 ќе бидат допирните точки на бараните кружници со k_1 . Задачата може да има најмногу две решенија.

\checkmark задача 7 (A, k_1, k_2). Нека бараната кружница $k(O, r)$ ги допира кружниците k_1 и k_2 , $r_1 \neq r_2$ на ист начин (прт. 16); тогаш



Прт. 16

допирните точки P_1 и P_2 се антихомотетични во однос на надворешниот центар на сличност S за k_1 и k_2 . Според задача 2 од §1, следува дека

$$\overline{SA} \cdot \overline{SX} = \overline{SP_1} \cdot \overline{SP_2}.$$

Но, за да ве антихомотетични точки во однос на S можеме да ги земеме пресечните точки M_1 и M_2 на правата O_1O_2 со кружниците k_1 и k_2 . Така, ќе имаме

$$\overline{SA} \cdot \overline{SX} = \overline{SM_1} \cdot \overline{SM_2},$$

што значи дека точките A, X, M_1 и M_2 лежат на иста кружница k_0 , т.е. ако низ точките M_1, M_2 и A повлечеме кружница k_0 , тогаш X е втората пресечна точка на правата AX и кружницата k_0 .

Во случајот $X \neq A$, задачата се сведува на задачата 4 (A, X, k_1), а во случајот $A=X$, задачата се сведува на задачата 6 (A, SA, k_1).

Во случајот кога бараната кружница k ги допира на различен начин кружниците k_1 и k_2 , разгледувајќа се спротивно, само што наместо највзорешниот центар на сличност, треба да се земе внатрешниот центар на сличност на кружниците k_1 и k_2 .


3. Прамен и сноп кружници

Нека е дадена права r . Множеството на сите кружници, такви што било две од нив за радикална оска ја имаат правата r , се нарекува прамен кружници. Правата r се нарекува радикална оска на праменот.

Еден прамен кружници е наполно определен со радикалната оска и една кружница или, пак, со две кружници. Центрите на сите кружници од праменот ќе лежат на права q нормална на радикалната оска r ; правата q се нарекува централна права или, само, центрија на праменот.

Нека праменот Π (читај Π) е зададен со радикалната оска r и една кружница k_0 . Ќе разгледаме три вида прамени, во зависност од заемниот однос на правата r и кружницата k_0 .

- Ако k_0 ја сече r во точките A и B (прт. 17 а)), тогаш и секоја друга кружница k од Π ја сече правата r во точките A и B , обратно, секоја кружница што минува низ точките A и B ќе припаѓа на Π . Според тоа, праменот Π се состои од сите кружници што минуваат низ точките A и B . Таков е случајот и со правата AB , разгледувана како кружница. Во овој случај Π се нарекува прамен со две базни точки или хиперболичен прамен.
- Ако k_0 ја допира r во точката A (прт. 17 б), тогаш и секоја друга кружница k од Π ја допира r во A и, обратно, секоја кружница што ја допира r во A припаѓа на Π . Според тоа,



Прт. 17

в) Ако k_0 нема засечни точки со r (прт. 17 в), тогаш и секоја друга кружница од Π нема засечника точка со r . Уште повеќе кој било две кружници од праменот Π немаат засечника точка. Праменот се нарекува елиптичен прамен.

Да забележиме дека нис секоја точка M од рамнината минува единствена кружница што припаѓа на даден прамен. За да то докажеме ова ќе ги разгледаме посебно сите три случаи.

- ✓ а) Ако праменот Π е хиперболичен со базни точки A и B и ако M е произволна точка од рамнината, тогаш или правата AB (ако A, B и M се колinearни) или, пак, кружницата описана околу триаголникот ABM , минува низ M и припаѓа на праменот Π .
- ✓ б) Ако праменот Π е парabolичен со радикална оска r и базна (граница) точка A , и ако M е произволна точка, тогаш или правата r (ако $M \in r$) или, пак, кружницата што минува низ M и ја допира правата r во точката A (а таа е единствена која кружница што ја допира r во A припаѓа на Π). Според тоа,

- ✓ в) Нека, сега, праменот Π е елиптичен и нека точката M не лежи на радикалната оска r . Ако $M \in q$ (q-центријата), (прт. 17 в)), тогаш постои единствена точка $M' \neq M$, така што важи $\overline{OM} \cdot \overline{OM'} = \overline{OP} \cdot \overline{OP'}$, па, значи, кружницата со дијаметар MM' ќе биде единствена што минува низ M и што припаѓа на Π . Според тоа, ако $M=M'$, тогаш кружницата ќе има радиус нула. Според тоа,

праменот содржи две точки N_1 и N_2 што лежат на центријата q

и што прилагаат на Π . Затоа, овој прамен се вика **уите** и прамен со две **граничи** точки. Нека точката M не лежи на q ; тогаш радикалната оска r на M и k_0 ќе ја сече радикалната оска r во некоја точка R . Постои единствена кружница k со центар на централата q и што ја допира правата RM во точката M . Значи, точката R има ист степен во однос на k и k_0 , па r е низна радикална оска, т.е. k минува низ точката M и припаѓа на Π .

Множеството од сите кружници, така што кои било три од нив имаат ист радикален центар R и сите прави низ точката R се нарекува **сноп кружници**. Точката R се нарекува **радикален центар** на снопот, а степенот m на точката R во однос на произволна кружница од снопот се нарекува **степен на снопот**.

Еден сноп Γ е наполно определен со:

- центарот и степенот,
- центарот и една кружница,
- степенот и две кружници, или
- три кружници.


Во зависност од заемната положба на центарот R во однос на кружниците од снопот Γ , ќе разликуваме три вида снопови.

Ако $m = a^2 > 0$, тогаш центарот R е нападорешна точка од сполот Γ и, според задача 3 од §2, кружницата (R, a) ги сече сите кружници од Γ ортогонално. Во овој случај може да кажеме дека сполот Γ се состои од сите кружници и прави кои ја сечат ортогонално кружницата (R, a) .

Ако $m = 0$, тогаш снопот Γ се состои од сите кружници и прави што минуваат низ точката R ; специјално, точката R како кружница припаѓа на снопот.

Ако $m = -a^2 < 0$, тогаш точката R е **внатрешна за сите кружници од Γ** и, според задачата 3 од §2, сите кружници од Γ ја ползват кружницата (R, a) . Во овој случај може да кажеме дека Γ се состои од сите кружници и прави кои кружницата (R, a) ја сечат во дијаметрално спротивни точки.

Прт. 18




Задачи

1. Да се докаже дека многеството за сноп кружници се подразбира и многеството на сите кружници чии центри лежат на падени прави r и сите прави нормални на правата r , т.е. многество то од сите кружници и прави кои ортогонално ја сечат правата r . Овој сноп кружници би бил од првиот тип, зашто правата r може да се разгледува како кружница.

2. Да се докаже дека многеството Π_1 , од сите кружници ортогонални на кружниците од праменот Π е прамен кружници.

Решение. Нека $k_1(O_1, r_1)$ и $k_2(O_2, r_2)$ се две произволни кружници од праменот Π со радикална оска r и централа q , а $k'_1(O'_1, r'_1)$ и $k'_2(O'_2, r'_2)$ се две произволни кружници од многест вото Π_1 (прт. 19). Видејќи k'_1 и k'_2 се ортогонални на k_1 и k_2 ,



Прт. 19

следува дека низните центри O'_1 и O'_2 лежат на радикалната оска r на k_1 и k_2 (види задача 1 од §2). Од друга страна, точките O_1 , O_2 имаат ист степен во однос на k'_1 и k'_2 , што значи дека правата q е радикална оска на k'_1 и k'_2 . Кружниците k'_1 и k'_2 се произволни од множеството Π_1 , што значи дека сите кружници од Π_1 имаат иста радикална оска, правата q , т.е. Π_1 е прамен кружници со радикална оска q и центар r .

Ако секоја кружница од друг прамен, прамените се нарекуваат конјугирани.

Задача 1. Ако единиот од два конјугирани прамена е елиптичен, тогаш другиот е хиперболичен и обратно. Ако, пак, единиот од два конјугирани прамени е параболичен, тогаш и другиот е параболичен. Докажи!


Решение. Нека Π е елиптичен прамен кружници со радикална оска r и централна q (прт. 20). Пресечната точка P на r и q е надворешна за кружниците од Π и, значи, е центар на кружница k' од конјугираниот прамен Π_1 . Бидејќи k' ја сече q (радикалната оска на Π_1) во две точки A и B , следува дека праменот Π_1 е хиперболичен.

Решение. Нека Π е хиперболичен прамен кружници со радикална оска r и централна q (прт. 20). Пресечната точка P на r и q е вонутрешна за кружниците од Π и, значи, е центар на кружница k' од конјугираниот прамен Π_1 . Бидејќи k' не минува низ точката P . Бидејќи тангентите на k' што минуваат низ точката P , ако такви постојат, може да се конструираат, лесно може да се конструира и бараната кружница k .

Задача 2. Даден е прамен Π со радикалната оска r и една кружница $k_1(O_1, r_1)$. Да се конструира кружница $k(O, r)$ која припаѓа на праменот Π и која допира ладена права a различна од r .

Решение. Ако a е паралелна со r , тогаш задачата се сведува на конструирања на кружница која минува низ точката $a \cap q$ (централата на Π) и да припаѓа на праменот Π .

Затоа, да претпоставиме дека правата a ја сече правата r . Пресечната точка да ја означиме со M . Тангентето распоредение од M до бараната кружница е исто со тангентното распоредение од M до k_1 , па бараната кружница може да се конструира.



Прт. 20

Обратно, нека Π_1 е хиперболичен прамен кружници со радикална оска q и центар r (прт. 20). Кружната од Π_1 со центар во точката $P=r \cap q$ ја сече радикалната оска q во точките

А и В. Ако $k_1(O_1, r_1)$ е произволна кружница од Π , а та пресечната точка на k_1 и k' , тогаш имаме $\overline{O_1T} < \overline{O_1P}$, па k_1 не ја сече радикалната оска r на Π . Значи, праменот Π е елиптичен.

Во случај кога единиот од прамените Π и Π_1 е параболичен, тврдевното е очигледно.

Задача 3. Даден е праменот Π со радикалната оска r и една кружница $k_1(O_1, r_1)$. Да се конструира кружница $k(O, r)$ која припаѓа на праменот Π и допира ладена кружница $k_2(O_2, r_2)$.

Решение. Нека r_{12} е радидалната оска на кружниците k_1 и k_2 . Бидејќи бараната кружница k припаѓа на праменот Π , радикалната оска на k_1 и k ќе биде правата r . Значи, радикалниот центар на k_1, k_2 и k ќе биде точката $P=r_{12} \cap r$, па радикалната оска на k_2 и k ќе биде тангента на k_2 што минува низ точката P . Бидејќи тангентите на k_2 што минуваат низ точката P , ако такви постојат, може да се конструираат, лесно може да се конструира и бараната кружница k .

Задача 4. Даден е прамен Π со радикалната оска r и една кружница $k_1(O_1, r_1)$. Да се конструира кружница $k(O, r)$ која припаѓа на Π и која допира ладена права a различна од r .

Решение. Ако a е паралелна со r , тогаш задачата се сведува на конструирања на кружница која минува низ точката $a \cap q$ (централата на Π) и да припаѓа на праменот Π .

Затоа, да претпоставиме дека правата a ја сече правата r . Пресечната точка да ја означиме со M . Тангентето распоредение од M до бараната кружница е исто со тангентното распоредение од M до k_1 , па бараната кружница може да се конструира.

Задача 5. Да се докаже дека пресекот на два спола кружници е прамен кружници или прамен прави.

Решение. Нека Γ_1 и Γ_2 се два спола кружници со центри O_1, O_2 и степени m_1, m_2 соодветно. Ако $O_1 \neq O_2$, тогаш $\Gamma_1 \cap \Gamma_2$ е прамен кружници со радикална оска O_1O_2 , а ако $O_1 = O_2 = 0$, е праменот прав со центар во O . Да разгледаме некои случаи при $O_1 \neq O_2$.


a) Нека $m_1=m_2=0$; тогаш $\Gamma_i, i=1,2$, е множеството на сите кружници коишто минуваат низ точката O_i , $i=1,2$, па, значи, $\Gamma_1 \cap \Gamma_2$ е множеството на сите кружници коишто минуваат низ точките O_1 и O_2 , т.е. хиперболичен прамен кружници со базни точки O_1 и O_2 .

б) Нека $m_1=a_1^2$, $m_2=a_2^2$; тогаш $\Gamma_1 \cap \Gamma_2$ е множеството од сите кружници коишто кружниците (O_1, a_1) и (O_2, a_2) ги сечат ортогонално. Според задача 1, $\Gamma_1 \cap \Gamma_2$ е прамен кружници.

в) Нека $m_1=0$, $m_2=a_2^2$; тогаш $\Gamma_1 \cap \Gamma_2$ е множеството на сите кружници коишто минуваат низ точката O_1 и кон (O_2, a_2) ја сечат ортогонално, а тоа е прамен кружници со барем една базна точка, т.е. хиперболичен или параболичен во зависност од тоа дали $O_1 \notin (O_2, a_2)$ или $O_1 \in (O_2, a_2)$.

Другите случаи ги оставаме на читателот.

Задача А (k_1, k_2, k_3). Да го разгледаме најопштиот случај кога центрите O_1, O_2, O_3 не се колинеарни и радиусите се меѓусебно различни (прт. 21).



Прт. 21

Нека бараната кружница $k(O, r)$ ги допира кружниците k_1, k_2, k_3 на ист начин, на пример, надворешно. Според задача 2 од §1, кога допира k_1 и k_2 во антихомотетични точки во однос на надворешниот центар на сличност S_{12} на k_1 и k_2 . Две антихомотични точки во однос на S_{12} можеме да најдеме; на пример, пресечните точки P_1 и P_2 на O_1O_2 со k_1 и k_2 соодветно. Низ точ-

ката S_{12} минува радикалната оска на кружницата k и произволна кружница низ P_1 и P_2 . На ист начин, ако P_3 е антихомотетична точка на P_2 во однос на надворешниот центар на сличност S_{23} на k_2 и k_3 , тогаш низ S_{23} минува радикалната оска на k и произволна кружница низ P_2 и P_3 .

Следствено, правата $S_{12}S_{23}$ е радидалната оска на k и кружницата низ точките P_1, P_2, P_3 . Ако \bar{k} е кружницата што минува низ точките P_1, P_2 и P_3 , тогаш задачата се сведува на конструкција на кружница што припаѓа на праменот Π определен со радикалната оска $S_{12}S_{23}$ и кружницата \bar{k} , и која ја допира, на пример, кружницата k_1 (види задача 3).

Според задачата од стр. 34, задачата може да има најмногу осум решенија.

На читателот му оставаме да ги разгледа и случаите $r_1 \neq r_2 = r_3$, односно $r_1 = r_2 = r_3$.

4. Инверзија

Нека $m = r^2$ е позитивен реален број, а O фиксирана точка во рамнината. На секоја точка $A \neq O$ ја придржуваате точката A' што лежи на полуправата OA и за која е исполнет условот

$$\overline{OA} \cdot \overline{OA'} = m. \quad (1)$$

Точката A' е еднозначно определена, па, значи, добиваме едно пресликување од $\mathbb{P} \setminus \{O\}$ во \mathbb{P} . Оп условот (1) следува дека ова пресликување е инјекција но не е сурјекција. Имено, не постои точка која се пресликува во точката O . Затоа, ако пресликувањето го разгледуваме како пресликување од $\mathbb{P} \setminus \{O\}$ во $\mathbb{P} \setminus \{O\}$, тоа ќе биде билкија што се вика инверзија со центар O и коефициент m ; ќе ја означуваме со $\iota(O, m)$ или, само со ι . Значи, $(\forall a \in \mathbb{P} \setminus \{O\}) \iota(A) = A' \iff A'$ лежи на полуправата OA и $\overline{OA} \cdot \overline{OA'} = m$.

Ќе наведеме и ќе докажеме некои својства на инверзијата.

✓ Теорема 1. Ако $\zeta(A) = A'$, тогам $\zeta(A') = A$, т.е. $\zeta^2 = \varepsilon$.

Доказ. Од $\zeta(A) = A'$ следува дека A' лежи на полуправата OA и, притоа, $\overline{OA} \cdot \overline{OA}' = m$. Ако $\zeta(A') = A$, тогам A ќе лежи на полуправата OA' , која се совпаѓа со полуправата OA и, притоа,

$$\overline{OA}' \cdot \overline{OA} = m = \overline{OA} \cdot \overline{OA}',$$

од каде што следува дека $A = A'$, т.е. $\zeta(A') = A$.


✓ Теорема 2. Ако A е точка од кружницата $k_o(O, \sqrt{m})$, тогам $\zeta(A) = A$ и, обратно, ако $\zeta(A) = A$, тогам A лежи на кружницата $k_o(O, \sqrt{m})$.

Значи, точките од кружницата $k_o(O, \sqrt{m})$ се единствени не-поминки точки за инверзијата ζ . Затоа, ова кружница се нарекува **кружница на инверзијата** ζ . Од ова, пак, следува дека една инверзија ζ е определена или со центарот и коефициентот или со кружницата на инверзијата.

✓ Теорема 3. Секоја внатрешна точка за кружницата $k_o(O, \sqrt{m})$ се пресликува при инверзијата во надворешна, а секоја надворешна се пресликува во внатрешна.

Доказ. Ако A е внатрешна точка за кружницата $k_o(O, \sqrt{m})$, тогам $\overline{OA} < \sqrt{m}$, па ако $\zeta(A) = A'$, тогам од $\overline{OA} \cdot \overline{OA}' = m$ следува дека $\overline{OA}' > \sqrt{m}$.

Конструкција. Да видиме како ја конструираме скликата A' на произволна точка A при инверзијата ζ , ако е позната кружницата k_o . Нека A е внатрешна точка за кружницата k_o (прт. 22). Низ



точката A изалекуваме нормала на OA , којашто ја сече кружни-тата k_o во точка T . Нека t е тангентата на k_o во точката T и

нека $B=t \cap OA$. Триаголниците OBT и OAT се правоаголни со заеднички агол кај темето O , па тие се слични, од каде што следува $\overline{OA} : \overline{OT} = \overline{OT} : \overline{OB}$, т.е.

$$\overline{OA} \cdot \overline{OB} = \overline{OT}^2 = m.$$

Значи, $B=A'=\zeta(A)$.


Ако, пак, точката A е надворешна за кружницата k_o , тогаш од $\zeta^2 = \varepsilon$ (Т.1) следува следнава конструкција на точката $A'=\zeta(A)$. Низ точката A ја повлекуваме едната тангента t на кружницата k_o и ортогоналната проекција од допирната точка T на t и k_o врз OA ќе биде точката $A'=\zeta(A)$.

✓ Теорема 4. Ако $\zeta(A)=A'$, $\zeta(B)=B'$, тогам $\zeta(A'B') = \zeta(OA'B) = \zeta(OAB)$. (2)

Доказ. Ако точките A, B и O се колинеарни, тогам тврдењето е јасно. Затоа, да претпоставиме дека точките A, B и O не се колинеарни и нека се распоредени, на пример, како на прт. 23. Од равенствата $\overline{OA} \cdot \overline{OA}' = m$ и $\overline{OB} \cdot \overline{OB}' = m$ добиваме

$$\overline{OA} : \overline{OB} = \overline{OB}' : \overline{OA}'.$$


Ова значи дека триаголниците OAB и $OB'A'$ се слични, т.е. вакајат равенствата (2).



Прт. 23

Да видиме сега во што се пресликува права при инверзија.

Нека а е дадена права и ζ инверзија со кружница k_0 . Ако а минува низ центарот О на инверзијата ζ (прт. 24). Низ точката О повлекуваме нормала n на правата а. Нека $P = a \cap n$ и нека $P' = \zeta(P)$, $M' = \zeta(M)$, каде што М е произволна точка од а. Според Т.4, триаголниците OPM и $OP'M'$ се слични. Но, триаголникот OPM е правоаголен со прав агол кај темето Р, па, следствено, триаголникот $OP'M'$ ќе биде правоаголен со прав агол кај темето M' .




Прт. 24

Според тоа, отсечката OP' од точката M' се гледа под прав агол, т.е. M' лежи на кружницата со дијаметар OP' . Видејќи точката М беше произволна од правата а, заклучуваме дека сликата на правата а при инверзијата ζ е кружницата со дијаметар OP' (се подразбира без точката О).

Со тоа ја докажавме следнава теорема.

→ **Теорема 5** Секоја права што минува низ центарот О на инверзијата ζ се пресликува сама во себе, а секоја права што не минува низ О се пресликува во кружница што минува низ О.

Од самот доказ на оваа теорема следува и ефективна конструкција на кружницата $\zeta(a)$ кога правата а не минува низ центарот О на инверзијата ζ (прт. 25).



Прт. 25


Како последица од Т.4 и Т.1 ја добиваме и следнава теорема.

! **Теорема 6.** Ако кружницата k_1 минува низ центарот О на инверзијата ζ , тогаш $\zeta(k_1)$ е права што не минува низ О.

Ефективната конструкција на правата $\zeta(k_1)$ е прикажана на прт. 26.

Останува да видиме во што ќе се пресликува кружницата k_1 при инверзијата ζ ако k_1 не минува низ центарот О на ζ .

Нека кружницата k_1 не минува низ центарот О на инверзијата ζ (прт. 27) и нека $\zeta(M_1) = M'_1$; тогаш $\overline{OM}_1 \cdot \overline{OM}'_1 = m$. Ако n е степенот на точката О во однос на кружницата k_1 , тогаш $\overline{OM}_1 \cdot \overline{OM}_2 = |n|$, па ќе имаме:



Прт. 26

Прт. 27


$$\overline{OM}'_1 = \frac{\overline{OM}'_1 \cdot \overline{OM}_1 \cdot \overline{OM}_2}{\overline{OM}_1 \cdot \overline{OM}_2} = \frac{n}{|n|} \cdot \overline{OM}_2,$$

т.е. $\overrightarrow{OM}'_1 = \frac{n}{n} \overrightarrow{OM}_2$. Значи, ако χ е хомотетијата со центар O и коефициент n/n , тогаш $M'_1 = \chi(M_2)$. Според тоа, $\zeta(M_1) = \chi(M_2)$, т.е. $\zeta(k_1) = \chi(k_1)$. Но кружница при хомотетија се пресликува во кружница, па, значи, $\zeta(k_1)$ ќе биде кружница што не минува низ центарот O на инверзијата ζ .

Со тоа ја докажавме следнава теорема.

Теорема 7. Кружница што не минува низ центарот O на инверзијата ζ се пресликува пак во кружница што не минува низ центарот O .

Ефективната конструкција на кружницата $\zeta(k_1)$ е како конструцијата на кружницата $\chi(k_1)$ (прт. 28). Имено, низ



Прт. 28

центарот O на инверзијата ζ повлекуваме произволна права a , различна од правата OO_1 , која кружницата k_1 ја сече во точките M_1 и M_2 . Ја наоѓаме точката $M'_1 = \zeta(M_1)$ и низ неа повлекуваме права паралела со правата OO_1 , ќе биде центарот на кружницата $\zeta(k_1)$. Значи, кружницата $\zeta(k_1)$ ќе биде кружницата $(O'_1, \overline{O'_1M'_1})$.


Да забележиме дека $O'_1 = \chi(O_1)$, но $O'_1 \neq \zeta(O_1)$.

Порано видовме дека неподвижни точки при инверзијата ζ со кружница k_0 се само точките од k_0 , па кружницата k_0 е точкасто неподвижна за ζ . Интересно е да видиме дали постојат

и други кружници, различни од k_0 , коишто се неподвижни при инверзијата ζ . За таа цел ќе ја докажеме следнава теорема.

Теорема 8. Кружницата k_1 , различна од k_0 , е неподвижна за инверзијата ζ ако и само ако k_1 ортогонално ја сече k_0 .

Доказ. Нека кружницата $k_1(O_1, r_1)$ ортогонално ја сече кружницата k_0 на инверзијата ζ (прт. 29). Нека $M \in k_1$, $M \notin k_0$;



Прт. 29

значи $\zeta(M) = M' \neq M$ и $M' \in \zeta(k_1) = k_1$. Видејќи едната од точките M, M' е надворешна, а другата внатрешна за кружницата k_0 , следува дека k_1 и k_0 се сечат. Едната пресечна точка да ја означиме со T . Тогаш триаголништите SMT и STM' се слични (види доказот на Т.4), од каде што следува дека

$$|OTM| = |OM'T| = \frac{1}{2}|TO_1M|,$$

од каде што следува дека $|OTM|$ е перифериски за кружницата k_1 , т.е., от е тангента на k_1 , а тоа значи дека k_1 е ортогонална на k_0 .

Обратното е јасно, запто при хомотетија али се запазуваат, па ако k_1 ортогонално ја сече кружницата k_0 на инверзијата ζ тогаш и кружницата $\chi(k_1) = \zeta(k_1)$ ќе ја сече ортогонално k_0 и ќе минува низ точките $k_1 \cap k_0$. Значи, $\zeta(k_1) = k_1$.

Од тоа што секоја инверзија е билекција, следува точноста на следнава теорема.

Теорема 9. Ако две прави, односно права и кружница, од-точкасто неподвижна за ζ . Интересно е да видиме дали постојат

Иако за решавање на задачите на Аполониј ќе ја користиме само Т.9, склак, за потполност, без доказ ќе ја наведеме и следнава теорема.

→ **Теорема 10.** Агол меѓу две прави, меѓу права и кружница или меѓу две кружници се запазува при секоја инверзија.

Тоа значи, дека ако правите a и b , правата a и кружницата k односно кружниците k_1 и k_2 се сечат под агол α , тогаш и $\zeta(a)$ и $\zeta(b)$, $\zeta(a)$ и $\zeta(k)$ односно $\zeta(k_1)$ и $\zeta(k_2)$ се сечат исто така, под агол α .


Задачи

✓ 1. Дадени се правите a и b . Дали постои инверзија ζ , така што $\zeta(a)=b$?

Решение. Според Т.5, таква инверзија постои $O \in \zeta a$ и само ако $a = b$.


✓ 2. Дадени се правата a и кружницата $k_1(O_1, r)$. Дали постои инверзија ζ , така што $\zeta(a)=k_1$?

Решение. Да, таква инверзија секогаш постои; конструкцијата на кружницата k_0 , во случајот кога правата a и кружница k_1 немаат заеднички точки, е дадена на прт. 30. Другите случаи се поедноставни и ги оставаме на читателот.



Прт. 30

✓ 3. Дадени се две кружници k_1 и k_2 . Дали постои инверзија ζ , така што $\zeta(k_1)=k_2$?



Прт. 31

Повлечеме тангентата на k во B , тогаш нејзините пресечни точки со полуправите OA и OC се точките $A'=\zeta(A)$ и $C'=\zeta(C)$, па страните OA и OC ќе се пресликаат со ζ во полуправите $A'K$ и $C'L$ соодветно. Правата AB не минува низ центарот O на инверзијата ζ , па тоа ќе се преслика со ζ во кружницата со дијаметар OA' , а страната AB ќе се преслика во лакот $A'B$; слично, страната BC ќе се преслика во лакот BC' од кружницата со дијаметар OC' . Бараната фигура е дадена на прт. 31.

Сега ќе преминеме на решавање на задачите на Аполониј.

✓ **Задача 3 (A,B,C).** Нека точките A,B лежат во една иста полутрамница во однос првата с и нека правите AB и C не се меѓусебно паралелни.

Нека ζ е инверзијата со центар A и коефициент \overline{AB}^2 , т.е. кружницата k_0 на ζ е со центар A и минува низ B ; тогаш $\zeta(B)=B$.

Решение. Кои било две кружници се хомотетични (имаат барем еден центар на сличност), па, значи, ако центарот на сличност не лежи на кружниците k_1 и k_2 , тогаш тој е центар на таква инверзија.


✓ 1. Дадена е инверзија ζ со кружница $k_0(O,r)$ и квадрат $OABC$, така што $\zeta(O)=B$. Да се конструира фигурата што е слика од квадратот $OABC$ при инверзијата ζ .

Решение. Правите OA и OC минуваат низ центарот O на инверзијата ζ , па тие се пресликуваат со ζ сами во себе. Ако ја

Правата с не минува низ точката A , па $\zeta(c)$ ќе биде кружница што минува низ A . Бараната кружница k минува низ точката A , па $\zeta(k)$ ќе биде права што минува низ точката $B=\zeta(B)$ и што ја допира кружницата $\bar{k}=\zeta(c)$, па, значи, правата $\zeta(k)$ може да ја конструираме. Според тоа, следува следнава конструкција.

- 1) Ја избирааме инверзијата ζ со кружница $k_o(A, \overline{AB})$.
- 2) Ја конструираме кружницата $\bar{k}=\zeta(c)$.
- 3) Низ точката $B=\zeta(B)$ ги повлекуваме тангентите t' и t'' на кружницата \bar{k} .
- 4) Бараните кружници се кружниците $k'=\zeta(t')$ и $k''=\zeta(t'')$.

На прт. 32 е дадено само едното решение.



Прт. 32

✓ Задача 4 (A, B, k_1). Нека точките A и B се или најврешни или внатрешни за кружницата k_1 .

Слично како во претходната задача, ако ζ е инверзија со кружница $k_o(A, \overline{AB})$, тогаш $\zeta(B)=B$, $\zeta(k_1)$ е кружница што не минува низ A и, притоа, точката B е најврешна за $\zeta(k_1)$. Ако $k(O, r)$ е бараната кружница, тогаш $\zeta(k)$ ќе биде тангента на $\zeta(k_1)$ низ точката B .

Задачата има две решенија.

✓ Задача 5 (A, b, c). Нека точката A не лежи на ниедна од правите b, c и нека ζ е инверзија со центар во A и произволен коефициент m ; тогаш $\zeta(b)$ и $\zeta(c)$ се кружници, а $\zeta(k)$ ќе биде заедничка тангента t на $\zeta(b)$ и $\zeta(c)$, која може да се конструира. На крајот, $k=\zeta(t)$.

Задачата може да има најмногу четири решенија. Бидејќи заедничката тангента t на кружниците $\zeta(b)$ и $\zeta(c)$, која ја конструира. На крајот, $k=\zeta(t)$.


✓ Задача 6 (A, b, k_1). Нека точката A не лежи на правата b и на кружницата k_1 и нека ζ е инверзија со центар во A и произволен коефициент m ; тогаш $\zeta(b)$ и $\zeta(k_1)$ се кружници, а $\zeta(k)$ ќе биде заедничка тангента t на $\zeta(b)$ и $\zeta(k_1)$, која може да се конструира. На крајот, $k=\zeta(t)$.

Задачата може да има најмногу четири решенија.

Во случајот кога точката A е најврешна за кружниците k_1 , коефициентот m на инверзијата ζ избери го така што кружниците k_o и k_1 се сечат ортогонално; тогаш ќе имаме $\zeta(k_1)=k_1$.


✓ Задача 7 (A, k_1, k_2). Нека точката A не лежи на ниедна од кружниците k_1, k_2 . Како во претходната задача, ако ζ е инверзија со центар во A и произволен коефициент m , тогаш $\zeta(k_1)$ и $\zeta(k_2)$ се кружници, а $\zeta(k)$ е заедничка тангента на $\zeta(k_1)$ и $\zeta(k_2)$.

Пред да ги решиме задачите 8, 9 и 10 ќе решиме две помошни задачи.



Да се докаже дека постои инверзија ζ , така што $\zeta(a)$ и $\zeta(k)$ се концентрични кружници.

Решение. Нека b е права низ O нормална на a и нека $P=a \cap b$ (прг. 33). Една од пресечните точки на кружницата $k_1(P, \overline{PT})$ со



Прг. 33

правата b нека биде точката S и нека ζ е инверзија со центар S и произволен коефициент. Тогаш $\zeta(a)$ и $\zeta(k)$ се кружници. Да ги најдеме низните центри.


Правата a ортогонално ги сече правата b и кружницата k_1 , што значи дека кружницата $\zeta(a)$ ортогонално ќе ги сече $\zeta(b)$ и $\zeta(k_1)$. Но, $\zeta(b)=b$, а $\zeta(k_1)$ ќе биде права. Значи, центарот O_1 на кружницата $\zeta(a)$ ќе биде точката $b \cap \zeta(k_1)$.

Кружницата k ортогонално ги сече правата b и кружницата k_1 , што значи дека кружницата $\zeta(k)$ ортогонално ќе ги сече правите $\zeta(b)=b$ и $\zeta(k_1)$. Значи, центарот O_2 на кружницата $\zeta(k_1)$ ќе биде точката $b \cap \zeta(k_1)$.

Следствено, кружниците $\zeta(a)$ и $\zeta(k)$ се концентрични.

ВАЖНА ЗАДАЧА 6. Нека кружниците k_1 и k_2 немаат заедничка точка. Да се докаже дека постои инверзија ζ , така што $\zeta(k_1)$ и $\zeta(k_2)$ се две концентрични кружници.

Решение. Нека $k_1(O_1, r_1)$ и $k_2(O_2, r_2)$ се две кружници што немаат заедничка точка, нека P е радикалната оска на k_1 и k_2 и нека $P=P_{1,2}$ (прт. 34). Кружницата $K(P, \overline{P}P)$ ортогонално



Прт. 34

ги сече кружниците k_1 и k_2 . Нека S е точка од $k \cap O_1O_2$ и нека ζ е инверзија со центар во S и произволен коефициент. Како во претходната задача, се докажува дека $\zeta(k_1)$ и $\zeta(k_2)$ се концен-

Задача 8 (a,b,k₁). Овде ќе го разгледаме само случајот кога една од правите a, b , на пример правата a , нема заеднички со кружницата k_1 . Тогаш постои инверзија ζ , така што $\zeta(a)$ и $\zeta(k_1)$ се концентрични кружници, а $\zeta(b)$ е кружница или права. Задачата се сведува на конструкција на кружница k' која ја допира кружницата (правата) $\zeta(b)$, специјални случаи од задача А ($\zeta(a)$, $\zeta(k_1)$, $\zeta(b)$) или од задача 9 ($\zeta(b)$, $\zeta(a)$, $\zeta(k_1)$).

Задача 9 (a,k₁,k₂). И овде, како во претходната задача, разгледај ги само случаите: а) а и k_1 (или а и k_2) немаат заедничка точка и б) k_1 и k_2 немаат заедничка точка.

Задача А (k₁,k₂,k₃). Според заемниот однос на кружниците k_1, k_2 и k_3 , можни се следниве случаи.

а) Две од кружниците k_1, k_2, k_3 , на пример k_1 и k_2 се докажуваат во точката T .

Ако и кружницата k_3 ги допира k_1 и k_2 во точката T , тогаш центрите O_1, O_2 и O_3 се колinearни, па секоја кружница k_3 со центар на правата O_1O_2 и што минува низ точката T е решението на задачата.

Ако k_3 минува низ T и ги сече k_1 и k_2 , тогаш ќе изберааме инверзија ζ со центар во T и произволен коефициент. Во овој случај $\zeta(k_1)$ и $\zeta(k_2)$ се две паралелни прави а $\zeta(k_3)$ е права што ги сече правите $\zeta(k_1)$ и $\zeta(k_2)$. Бараната кружница k не може да минува низ T , па $\zeta(k)=k'$ ќе биде кружница што ги допира правите $\zeta(k_1)$, $\zeta(k_2)$ и $\zeta(k_3)$. Значи, кружницата $k'=\zeta(k)$ може лесно да се конструира, зато $\zeta(k_1)$ и $\zeta(k_2)$ се меѓусебно паралелни. На крајот кружницата $k=k'(k')$ е бараната. Задачата има две решенија.

Ако k_3 не минува низ точката T , пак избирааме инверзија ζ со центар во точката T и произволен коефициент. Тогаш $\zeta(k_1)$ и $\zeta(k_2)$ се две паралелни прави, а $\zeta(k_3)$ ќе биде кружница. Сликата $\zeta(k)$ на бараната кружница k е или права или кружница. Ако $\zeta(k)=k'$ е права, тогаш таа ќе биде тангента на кружницата

$\zeta(k_3)$ паралелна со правите $\zeta(k_1)$ и $\zeta(k_2)$, па таа може лесно да се конструира. Ако $\zeta(k)=k'$ е кружница, тогаш таа ќе ги допира паралелните прави $\zeta(k_1)$ и $\zeta(k_2)$ и ќе ја допира кружницата $\zeta(k_3)$, па може лесно да се конструира. На крајот $k=\zeta(k')$ е бараната кружница.

б) Кои биле две од кружниците k_1, k_2, k_3 не се допираат, а на пример кружниците k_1 и k_2 се сечат во точката A.

Ако k_3 минува низ A, тогаш, според направената претпоставка, k_3 ги сече k_1 и k_2 во точката A, па ако ζ е инверзија со центар A и произволен коефициент, тогам $\zeta(k_1)$, $\zeta(k_2)$ и $\zeta(k_3)$ се три прави кои формираат триаголник. Бараната кружница k не може да минува низ точката A, па $\zeta(k)=k'$ ќе биде кружница што ги допира правите $\zeta(k_1)$, $\zeta(k_2)$ и $\zeta(k_3)$. Кружницата $k'=\zeta(k)$ може лесно да се конструира, па $k=\zeta(k')$ ќе биде бараната кружница.

Ако k_3 не минува низ A и ако ζ е инверзија со центар A и произволен коефициент, тогаш $\zeta(k_1)$ и $\zeta(k_2)$ се две прави што се сечат, а $\zeta(k_3)$ ќе биде кружница. Бараната кружница k не минува низ точката A, па $k'=\zeta(k)$ ќе биде кружница што ги допира пресечните прави $\zeta(k_1)$ и $\zeta(k_2)$ и што ја допира кружницата $\zeta(k_3)$. Значи, k' може да се конструира, па $k=\zeta(k')$ ќе биде бараната кружница.

в) Две од кружниците k_1, k_2, k_3 , на пример k_1 и k_2 , немаат заедничка точка; тогаш постои инверзија ζ , така што $\zeta(k_1)$ и $\zeta(k_2)$ се две концентрични кружници, а $\zeta(k_3)$ ќе биде права или кружница. Ако k е бараната кружница, тогам $k'=\zeta(k)$ ќе биде кружница што ги допира концентричните кружници $\zeta(k_1)$ и $\zeta(k_2)$ и ја допира правата (кружницата) $\zeta(k_3)$. Значи, кружницата $k'=\zeta(k)$ може лесно да се конструира, па $k=\zeta(k')$ ќе биде бараната кружница.

Д о д а т о к

Г л а в а I

Г Е О М Е Т Р И С КИ КОНСТРУКЦИИ

Да се конструира триаголник ако се познати (1-26):

- $K \rightarrow \sqrt{1}.$ $t_a, t_b, t_c;$ $\sqrt{2}.$ $b, c, h_a;$
- $K \rightarrow \sqrt{5}.$ $a, h_a, a;$ $\sqrt{4}.$ $a, t_a, h_a;$
- $K \rightarrow \sqrt{7}.$ $h_a, s_a, a;$ $\sqrt{6}.$ $a, b+c, a;$
- $K \rightarrow \sqrt{9}.$ $b, Y, 2s;$ $\sqrt{10}.$ $a, c-b, b;$
- $K \rightarrow \sqrt{12}.$ $a, c-b, a;$ $\sqrt{11}.$ $b, c, Y-b;$
- $K \rightarrow \sqrt{13}.$ $a, c-b, Y-b;$ $\sqrt{12}.$ $a, b+c, Y-b;$
- $K \rightarrow \sqrt{15}.$ $a, b+c, b;$ $\sqrt{13}.$ $b+c, b, h_c;$
- $K \rightarrow \sqrt{17}.$ $b+c, a, b;$ $\sqrt{14}.$ $a, b+c, h_b;$
- $K \rightarrow \sqrt{19}.$ $b+c, h_c, b-Y;$ $\sqrt{20}.$ $b-a, h_b, Y;$
- $K \rightarrow \sqrt{21}.$ $b-c, h_b, b-Y;$ $\sqrt{22}.$ $b-c, a, b;$
- $K \rightarrow \sqrt{23}.$ $b-c, h_b, a;$ $\sqrt{24}.$ $a, b-c, h_c;$
- $K \rightarrow \frac{25}{25}.$ $a, a, b+h_c;$ $\sqrt{26}.$ $a, a, h_c-h_b;$
- $K \rightarrow \sqrt{27}.$ Да се конструира паралелограм ако е познат еден агол и дијагонали.

28. Да се конструира трапез ако му се познати четирите страни.

✓29. Да се конструира трапез ако се познати основите и дијагонали.

✓30. Да се конструира четириаголник ако се познати три страни и алиите што лежат на четвртата страна.

✓31. Да се конструира четириаголник ако се познати страни и аголот меѓу две спротивни страни.

✓32. Да се конструира четириаголник ако се познати дијагонали, аголот помеѓу нив и две страни.

✓33. Да се конструира четириаголник ако се познати страни и аголот помеѓу нив и даден радиус.

✓34. Да се најде ГМП на кружниците со даден радиус, коишто минуваат низ дадена точка.

✓35. Да се најде ГМП на кружниците со даден радиус, коишто допираат дадена права.

✓36. Да се најде ГМП на кружниците со даден радиус, коишто минуваат дадена кружница.

\checkmark 37. Да се конструира кружница со даден радиус која минува низ дадена точка и допира:

- a) дадена права;
 b) дадена кружница.

\checkmark 38. Да се конструира кружница со даден радиус којашто допира дадена права и дадена кружница.

\checkmark 39. Да се најде ГМТ на кружниците, коишто допираат две дадени паралелни прави.

\checkmark 40. Да се најде ГМТ на кружниците, коишто допираат две дадени концентрични кружници.

\checkmark 41. Да се најде ГМТ од кои една дадена кружница се гледа под даден агол.

\checkmark 42. Да се најде точка, од која една дадена кружница и една дадена отсечка се гледаат под даден агол.

\checkmark 43. Да се најде ГМТ од кои две дадени кружници се гледаат под еден ист агол.

\checkmark 44. Нека точката А е на ворешна за кружницата k . Низ точката А да се повлече права, којашто ја сече кружницата k во точките М и N, така што $\overline{AM} = \overline{MN}$ (точката М е меѓу А и N).

\checkmark 45. Низ пресечната точка на две дадени кружници да се повлече секант, така што нејзиниот внатрешен дел е еднаков со дадена отсечка.

\checkmark 46. Да се најде геометриското место на средините на отсечите коишто дадена кружница ги отсечува од правите што минуваат низ дадена точка.

\checkmark 47. Да се најде ГМТ за кои разликата од квадратите на расстојанијата до две дадени точки е константна.

\checkmark 48. Даден е квадрат ABCD со страна a. Да се најде ГМТ за кои збирот на расстојанијата до правите AB, BC, CD и DA е константен.

\checkmark 49. Да се најде ГМТ, така што односот на нивните расстојанија по две дадени прави е $t:p$.

\checkmark 50. Да се конструира права, којашто:

- минува низ дадена точка и дадена кружница ја сече под даден агол;
- две дадени кружници ги сече под даден агол.

\checkmark 51. Дадени се две концентрични кружници k_1 , (O, r_1) и k_2 , (O, r_2) , $r_1 > r_2$. Да се повлече права p којашто ги сече тие кружници последователно во точките A, B, C и D, така што $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD}$.

\checkmark 52. Дадени се три концентрични кружници k_1 , k_2 и k_3 . Да се повлече права p , којашто ги сече кружниците последователно во точките A, B, C, D, E, F така што $\overline{AB} = \overline{BC} = \dots = \overline{EF}$.

\checkmark 53. Да се конструира правоаголен триаголник, ако е позната висината, спуштена од темето на правиот агол и ако едната катета е двапати поголема од другата.

\checkmark 54. Да се конструира триаголник ABC ако се дадени α , β и h_c .

\checkmark 55. Да се конструира триаголник ABC ако е дадена симетралата на најмалиот од неговите агли, а неговите страни се односно B и D , се паралелни.

\checkmark 56. Дадени се кружници k_1 , k_2 што се допираат во точката T. Низ точката T се повлечен две прави a и b кои кружницата k_1 ја сечат во точките A и B, а кружницата k_2 во точките C и D, соодветно. Докажи дека:

- правите AB и CD се паралелни;
- тангените на k_1 и k_2 соодветно во точките A и C,

\checkmark 2. Нека Q е пресечната точка на продолженијата од краџите AB и BC на трапезот ABCD, а P пресекот на неговите дијагонали. Докажи дека кружниците описаны околу триаголниците:

- a) AHQ и CDQ ; b) ABP и CDP се допираат.

\checkmark 3. Дадена е кружницата (O, r) и точка A на неа. Да се определи геометриското место на средините од тетивите повлеченци од A.

\rightarrow \checkmark 4. Дадена е кружница (O, r) и точки A, B, C на неа. На кружницата (O, r) да се најде точка X, така што тетивата BC ја дели на половина тетивата AX.

\checkmark 5. Над основите AB и DC од трапезот ABCD на иста страна од нив, конструирани се рамнострани триаголници ABM и DCN. Докажи дека правата MN минува низ пресечната точка O од продолженијата на краџите.

\checkmark 6. Над основите AB и DC на трапезот ABCD, надвор од него, конструирани се квадрати. Докажи дека правата што ги поврзува центрите на квадратите минува низ пресекот P од дијагоналите на трапезот.

\checkmark 7. Над основите AB и DC на трапезот ABCD, надвор од него, конструирани се квадрати. Докажи дека точките M и Q пресекот од продолженијата на краџите. Докажи дека точките M, N, P, Q се колинеарни.

\checkmark 8. Правата p , паралелна со страната AB на триаголникот ABC, ги сече страните AC и BC во точките M и N соодветно. Нека S_1 и S_2 се центрите на кружниците описаны соодветно околу триаголниците ABC и MNC. Докажи дека точките S_1 и S_2 и C се колинеарни.

\checkmark 9. На страната AB од триаголникот ABC положени се две еднакви отсечки AM и BN, низ точките M и N повлеченци се прави p и q паралелни со AC и BC соодветно. Докажи дека точката $P=p \cap q$ лежи на тежишната линија t_C .

\checkmark 10. Нека C, D и E се три колинеарни точки, а T_1 , T_2 и T_3 тежиштата на триаголниците ABC, ABD и ABE. Докажи дека точките T_1 , T_2 и T_3 се, исто така, колинеарни.

\checkmark 11. Дадени се две концентрични кружници k_1 , (O, r_1) и k_2 , (O, r_2) , $r_1 > r_2$. Да се повлече права p којашто ги сече тие кружници последователно во точките A, B, C и D, така што $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD}$.

\checkmark 12. Дадени се три концентрични кружници k_1 , k_2 и k_3 . Да се повлече права p , којашто ги сече кружниците последователно во точките A, B, C, D, E, F така што $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DE} = \overline{EF}$.

\checkmark 13. Да се конструира правоаголен триаголник, ако е позната висината, спуштена од темето на правиот агол и ако едната катета е двапати поголема од другата.

\checkmark 14. Да се конструира правоаголен триаголник, ако е позната висината, спуштена од темето на правиот агол и ако едната катета е двапати поголема од другата.

\checkmark 15. Да се конструира триаголник ABC ако е дадена симетралата на најмалиот од неговите агли, а неговите страни се односно како $m:n:p$ ($m < n < p$).

✓ 16. Да се конструира триаголник ABC , ако се познати: темто $\angle A$, ортоцентарот H и центарот O на описаната кружница.

✓ 17. Во триаголникот ABC да се впише триаголник PQR чии страни се нормални на страните од триаголникот ABC .

✓ 18. Во даден триаголник ABC да се впише ромб со острар агол $\alpha=60^\circ$, така што две негови соседни темиња да лежат на AB , а другите две соодветно на BC и CA .

✓ 19. Нека AB е дијаметар на кружницата (O, r) . Да се конструира квадрат $KLMN$, такашто K и L да лежат на дијаметарот AB , а M и N на кружницата (O, r) .

✓ 20. Во дадена кружница $K(O, r)$ да се впише триаголник ABC , сличен со даден триаголник PQR .

✓ 21. Правите a и b односно c и d се сечат надвор од листот на кој пртаме. Низ дадена точка S да се повлече права p паралелна со правата MN , каде што $M=a \cap b$, $N=c \cap d$.

Г л а в а III

Т Е О М Е Т Р И ЈА Н А К Р У Ж Н И ЦА

✓ 1. Да се докаже дека трите секанти на три кружници кои попарно се сечат, минуваат низ една иста точка. —

✓ 2. Да се докаже дека секантата на две кружници што се сечат $\overline{J_1 J_2}$ поползи отсечката, од нивната заедничка надворешна тангента $M\bar{E}G$ допирните точки.

✓ 3. Дадена е кружница k_1 и точка M надворешна за k_1 . Нека k_1 сече точките \bar{K} и \bar{k}_1 . Да се најде ГМТ $A\bar{F}\bar{t}$, каде што t е тангентата на k_1 во M . $\bar{t}_A = t$.

✓ 4. Да се конструира кружница, којашто ортогонално ги сече две дадени кружници и допира:

- дадена права;
- дадена кружница.

✓ 5. Да се конструира кружница, којашто минува низ две дадени точки и сече дадена права (кружница) под даден агол α , $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.

✓ 6. Да се конструира кружница, којашто минува низ една дадена точка и сече две дадени кружници под даден агол α , $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.

✓ 10. Даден е квадрат, на кој две темиња лежат на кружница k_1 на инверзијата ζ , а третото теме е центарот O на инверзијата ζ . Да се најде фигурата во која се пресликува квадратот при инверзијата ζ .

✓ 11. Во кружницата k_1 на инверзијата ζ е вписан триаголник ABC . Да се најде фигурата во која се пресликува триаголник ABC при инверзијата ζ .

✓ 12. Кружниците k_1 и k_2 се допираат во центарот O на инверзијата ζ . Во што се пресликуваат кружниците k_1, k_2 при инверзијата ζ ?

✓ 13. Да се конструира кружница, којашто минува низ две дадени точки A, B и ортогонално ја сече кружницата k_1 .

✓ 14. Со помош на инверзија да се реши задачата 5.

✓ 15. Дадена е точка O и две прави a, b (две кружници k_1, k_2) кои не минуваат низ O . Низ точката O да се повлече права p , којашто ги сече првите a и b (кружниците k_1 и k_2) во точките A и B соодветно, така што $\overline{OA} \cdot \overline{OB} = n^2$, n — даден број.

✓ 7. Да се конструира кружница, којашто минува низ две дадени точки и сече дадена права (кружница) под даден агол α , $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.

✓ 8. Да се конструира кружница која минува низ една дадена точка и сече две дадени кружници под даден агол α , $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.

✓ 9. Да се конструира кружница која минува низ дадена точка M , кружницата k_1 ја сече ортогонално, а кружницата k_2 ја преполовува.

✓ 10. Да се конструира кружница, којашто минува низ дадена точка M , а кружниците k_1 и k_2 ги преполовува.

✓ 11. Дадени се две кружници k_1 и k_2 . Да се најде ГМТ M , така што разликата од квадратите на тангентите повлеченни од M на k_1 и k_2 има константна вредност m .

Л и т е р а т у р а

[1] Аргунов Б.И., Балк М.Б.: Геометрически построения на плоскости, Москва, 1957

[2] Делоне Б., Житомирский О.: Задачник по геометрии, Москва-Ленинград, 1952

[3] Моденов П.С.: Сборник задач по специальному курсу Элементарной математики

[4] Петров К.: Аполлониеви задачи, София, 1969

[5] Яглом И.М.: Геометрические преобразования, Москва, 1956

С О Д Р Ж И Н А

Вовед: Задачите на Аполониј

Гл. I: ГЕОМЕТРИСКИ КОНСТРУКЦИИ

1. Што е "конструктивна задача"	5
2. Како се решава една конструктивна задача	5
3. Колку решенија има една конструктивна задача	8
4. Елементарни конструктивни задачи	9
5. Решавање на конструктивна задача	11
6. Геометриско место на точки	14
7. Метод на геометрички места	16

Гл. II: ХОМОТЕТИЈА

1. Дефиниција и својства	26
2. Слики на некои фигури при хомотетија	29
3. Состав на две хомотетии	31
4. Хомотетија на кружници	33
5. Примена на хомотетијата	36

Гл. III: ГЕОМЕТРИЈА НА КРУЖНИЦА

.1. Степен на точка во однос на кружница	43
2. Радикална оска и радикален центар	48
3. Прамен и сноп кружници	56
4. Инверзија	63
Додаток: Збирка задачи	77
Л и т е р а т у р а	82