

## ЗА ЕДЕН ВИД КОНЕЧНИ НЕКОМУТАТИВНИ ГРУПИ

Г. Чупона

1. Како што е познато, постои комутативна група со произволен број елементи, но не е ист случајот и со некомутативните групи; така на пример, не постои некомутативна група со  $p^2$  елементи, ако  $p$  е прост број<sup>1</sup>).

Во точката 2 од ова работа, даваме еден пример за некомутативна група со  $2m$  елементи, а потоа, во точката 3, покажуваме дека таа е единствената група со  $2m$  елементи што има  $m$  максимални циклични подгрупи со по 2 елементи, а една со  $m$ ; исто така, покажуваме и дека постојат само 2 групи со  $2p$  елементи кога  $p$  е прост број.

2. Нека  $M$  е множество со  $2m$  елементи, во коешто ја дефинираме операцијата „ $\circ$ “ со релациите

$$1^\circ x \circ a_m = a_m \circ x \text{ за секое } x \in M, \quad 2^\circ a_i \circ a_j = a_{i+j}, \quad 3^\circ b_i \circ b_i = a_m \\ 4^\circ b_i \circ b_j = a_{i-j}, \quad 5^\circ b_i \circ a_j = b_{i-j}, \quad 6^\circ a_i \circ b_j = b_{i+j}$$

а при тоа место  $i-j$  ( $i+j$ ), во случај кога  $i-j \leq 0$  ( $i+j > m$ ), се заменува најмалиот природен број  $r$  што ја задоволува релацијата  $i-j \equiv r \pmod{m}$  ( $i+j \equiv r \pmod{m}$ ).

Лесно се покажува дека  $M_0$  е група и тоа некомутативна, за  $m > 2$ . Навистина, од  $1^\circ$  следува дека  $a_m$  е идентичен елемент, а од  $2^\circ$  ( $3^\circ$ ) дека  $a_{m-i}$  ( $b_i$ ) е инверзен елемент за  $a_i$  ( $b_i$ ). Исто така, упоредувајќи ги сите изрази од облик  $x \circ (y \circ z)$  со  $(x \circ y) \circ z$ , се покажува дека операцијата „ $\circ$ “ е асоцијативна. На пример,  $b_i \circ (b_j \circ b_v) = b_i \circ a_{j-v} = b_{i-j+v}$ ;  $(b_i \circ b_j) \circ b_v = a_{i-j} \circ b_v = b_{i-j+v}$ . За  $m > 2$  групата е некомутативна, оти на пример  $b_2 \circ b_1 = a_1 \neq a_{m-1} = b_1 \circ b_2$ .

3. Теорема 1. Постои само една група со  $2m$  елементи што има  $m$  максимални циклични подгрупи со по два елементи, а една со  $m$ .

Теоремата ќе ја докажеме на тој начин што ќе покажеме дека секоја група  $G$  со горните особини е изоморфна на изнесениот пример 2.

Ако со  $a^1$  е означен некој генератор од цикличната подгрупа со  $m$  елементи, а со  $b_i$  генераторите на цикличните подгрупи со по 2 елементи, очигледно ќе бидат задоволени релациите  $1^\circ$ ,  $2^\circ$  и  $3^\circ$ . Со промена на индексите во  $b_i$  може

<sup>1</sup>) Да се види на пример G. Scorza *Gruppi Astratti, Roma* 1942 стр. 185

да се уреди да биде задоволена и релацијата  $6^\circ$ . Навистина, не може да биде  $a^i b_j = a^v$ , оти спрема  $2^\circ$ , во тој случај би добиле  $a^{m-i} (a^i b_j) = a^{v-i}$  т. е.  $b_j = a^{v-i}$  што не е можно. Значи  $a^i b_j = b_v$ ; ако ставиме  $b_1 = b'_1$ ,  $a^i b_1 = b'_{i+1}$ ,  $a^i b'_{i+1} = b'_{i+(i+1)}$  и т. н. ја добиваме релацијата  $6^\circ$ , а од тоа следува дека ќе бидат исполнети и релациите  $4^\circ$  и  $5^\circ$ , оти тие произлегуваат непосредно од  $1^\circ$ ,  $2^\circ$ ,  $3^\circ$  и  $6^\circ$ . Со тоа покажавме дека  $G$  е изоморфна со примерот  $M_0$  од 2, а од тоа, бидејќи обично изоморфните групи не се сметаат за различни, следува точноста на теоремата.

Во случајот кога  $m$  е прост број, како следствие од теоремата 1 можеме да ја изнесеме и следната

Теорема 2. Постојат само две групи со  $2p$  елементи кога  $p$  е прост број.

Доказ. Ке покажеме дека освен цикличната група и примерот  $M_0$  од 2, не постои друга група со  $2p$  елементи. Спрема општо познатата теорема на Sylow, секој елемент од групата со  $2p$  елементи може да има ред 2 или  $p$ . Од тоа следува можноста да постои група со  $2p$  елементи и од облик  $G = \{a, a^2, \dots, a^{p-1}, b, b^2, \dots, b^{p-1}, c, e\}$ , каде  $a^p = b^p = c^2 = e$  е идентичниот елемент. Лесно се покажува дека тоа не е можно за  $p > 2$ . Навистина, не може да биде  $a^i b^j = a^v$ , оти од тоа би добиле  $b^j = a^{v-i}$ . Значи  $a^i b^j = c$  за секое  $i$ , но и тоа не е можно, оти на пример за  $i=1$  и  $i=2$  добиваме  $a = a^2$ . Ако е  $p=2$  последниот случај е навистина možen, но очигледно се сведува на споменатата група  $M_0$  од 2.

Последната теорема не е точна кога  $m$  не е прост број; на пример за  $m=4$  постои и нецикличната комутативна група со 8 елементи определена со таблицата

$\circ$	$e$	$a$	$b$	$c$	$d$	$f$	$g$	$h$
$e$	$e$	$a$	$b$	$c$	$d$	$f$	$g$	$h$
$a$	$a$	$e$	$c$	$b$	$f$	$d$	$h$	$g$
$b$	$b$	$c$	$e$	$a$	$g$	$h$	$d$	$f$
$c$	$c$	$b$	$a$	$e$	$h$	$g$	$f$	$d$
$d$	$d$	$f$	$g$	$h$	$e$	$a$	$b$	$c$
$f$	$f$	$d$	$h$	$g$	$a$	$e$	$c$	$b$
$g$	$g$	$h$	$d$	$f$	$b$	$c$	$e$	$a$
$h$	$h$	$g$	$f$	$d$	$c$	$b$	$a$	$e$

Summary

#### ON FINITE GROUPS

G. Čupona

In this note an example of noncommutative group with  $2m$  elements is given, and it is shown that it is the only one group which has  $m$  maximal cyclic subgroups with two elements and one maximal cyclic subgroup with  $m$  elements. Hence follows that only two groups with  $2p$  elements exist if  $p$  is a prime.